



Philos. 3 May. a.

Der D. Kreisbibliothek
Ragunburg zum Geschenk
von

M. Harms,
D. Kreisbibliothekar.
Ragunburg, 22. Okt. 1890.

Carl Fried. Heindrich
1849

5. alt. Jopptat in Ragunburg.
1880

Lehre

von der

A. L. G. C. P. R. A.



A. A. B. B. A.



Addition und Subtraction mit Buchstaben.

1. Addition.

1. Wenn man zwei Submagazine zu addiren, ist man allem
Sachverständigen, das dieselben gleich sind. Sind die Größen
ungleich, so macht man sie in alphabetischen Ordnung auszusatz
sind sie gleich, so macht man dieselben reductirt.

$$z. B. 6a + 4z - 2x + 12m = 6a + 12m - 2x + 4z.$$

Man läßt sich also die in Größen ungleich sind, nicht
reductiren, als für die in alphabetischen Ordnung
auszusatz zu machen.

$$2. 3a + 6a + 5ab - 2ab = 9a + 3ab.$$

Wenn man solche Größen gegeben sind, so andern man
sich die Summe der Buchstaben, so in der gleichen Art
reductiren und dann die in der Summe der Buchstaben
auszusatz zu machen.

c. Subtraction

Wenn die abzuziehende GröÙen mit der zu ziehenden, man sie ab-
gezogen werden soll, kein Vielfaches von der zu ziehenden ist, so wird die
Subtraction eine Zerlegungsgeschichte. Daß man die zu ziehende
alle Ziffern in die abzuziehende setzt, man dann die zu ziehende
die Vielfache der zu ziehenden absetzt und ab-
setzt.

$$19a - 11a = 8a$$

$$21(3a - 2b) - 11(3a - 2b) = 10(3a - 2b)$$

$$31(4a - 9b + 6c) - 21(4a - 9b + 6c) = 10(4a - 9b + 6c).$$

Wenn man sich aber in der Zerlegung gegebener GröÙen
gleichnamige Vielfache, so andern man sie zu 10 auf
den Absetzer, setze sie ganz in die abzuziehende, und dann

in der abzuziehenden GröÙen alle Ziffern in die abzuziehende
gesetzt, und addiren man mit der zu ziehenden die zu ziehende
Ziffern.

Von Grad der Potenzen heißt darauf, das Bruch
zusammengefasst mit seiner gleichen
ungeteilt Bruch; allein ungeteilt zusammengefasst
mit seiner gleichen Bruch.

Multiplication und Division der Buchstaben.

1. Multiplication der Potenzen.

Wenn man zwei Potenzen miteinander multipliziert
 alle Produkte, welche aus gleichen Faktoren
 bestehen und unter sich selbst Produkt aus 2 Faktoren
 in 2^{ten}, aus 3 Faktoren in 3^{ten} Potenz, aus 4 Faktoren
 in 4^{ten} Potenz d. s. m. in Faktoren gleich sind.

z. B. $a^2 \cdot a^2$ = zweifache Potenz

a^3 = " dritte " } a^4

a^4 = " vierte "

[illegible]

Später zu dem gleichen Wäzle, oder zu demselben Wäzle
im Inneren zu kommen, welche die unvollständigen Wäzle geben

3. L. a³, a⁵.

Patruzeu mare maslinaceu Muzale, Ispireanu, Iacu

Thunzeln ist eine unglückselige Frau.

Der Patenzeugen aus nachstehender Margarine mit einem Drogen
müßig zu sein, und man dieselben mit dem Maltiglikation

grüßte, und von demselben und 5 L. 10 S. für einen Abt.

Кинзигу оутрудил. г. Л. $A^2 \times B^3 = A^2 \times B^3$ а также Алгебраичес.

Am. b.

Die oben gesetzte man nimmst die Mängel einmal und
 wenn diese Mängel einmal gegeben sind, so kann man, wenn
 man diesen den gegebenen den Faktoren gleich ist, so ist

$$L. a^3 \times a^2 = a a a \times a a = a a a a a = a^5$$
 Im Allgemeinen

$$a^m \times a^n = \underline{a^{m+n}}$$

Die man sich sein gegebenes Produkt selbst, und zwar
 in jedem Fall.

Im diesen Fall setzt man die Mängel einmal und
 gibt es eine gegebenes, wenn man das Produkt aus den
 gegebenen gegebenes gegebenes gleich ist, so ist $L. a^3 \times a^2 = a^5$ oder
 $(a^3)^2 = a^3 \times a^3 = a^{3+3} = a^{3 \times 2} = a^6$

Im Allgemeinen $(a^m)^n = \underline{\underline{a^{m \times n}}}$

Man sieht aus diesem Produkt, dass das Produkt
 zu einem gegebenen Produkt zu geben, kann man das Produkt zu

diesen Potenz angeben man nur die in der Potenz stehende
 Buchstaben so dem das Produkt gebildet man nur.
 z. B. $a^2 b^3 = a \times a \times b \times b \times b$ oder $a^2 b^3 = a b . a b . a b = a a b b b =$
 $a^3 b^3$.

Will man nun die zu irgend einer Potenz angeben,
 so muß man erst seine Zahlen als sein Element und diese
 Potenz angeben man nur.

$$\text{z. B. } \left(\frac{a}{c}\right)^3 = \frac{a^3}{c^3} \text{ oder } \left(\frac{a}{c}\right)^3 = \frac{a \times a \times a}{c \times c \times c} = \frac{a . a . a}{c . c . c} = \frac{a^3}{c^3} .$$

Wenn das Maßzahl einer Potenz ist, so muß man
 seinen Potenzen dasselbe schreiben, also selbst ist, wenn
 das Produkt aus 2 verschiedenen Zahlen ist, dann
 als je den seinen Faktoren.



$$\begin{array}{r}
 \text{II} \quad a-b \text{ Luckmann} \\
 \hline
 a-b \\
 a^2-ab \\
 -ab+b^2 \text{ Grilbacher} \\
 \hline
 a^2+2ab+b^2 \text{ Landwehr}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{III} \quad a+b \text{ Luckmann} \\
 \hline
 a-b \\
 a^2+ab \\
 -ab-b^2 \text{ Grilbacher} \\
 \hline
 a^2-b^2 \text{ Landwehr}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{IV} \quad a+b-d \\
 \hline
 a-b-d \\
 a^2+ab-ad \\
 -ab-b^2+b^2 \\
 -ad-bd+d^2 \\
 \hline
 a^2-2ad-b^2+d^2
 \end{array}$$

$$\text{V} \quad 5a-2b-d$$

$$2a+3b-2d$$

$$\begin{array}{r}
 10a^2-4ab-2ad \\
 +15ab-6b^2-2bd \\
 -10ad+4bd+2d^2
 \end{array}$$

$$10a^2+11ab-12ad-6b^2+6bd+2d^2$$

$$\begin{array}{r}
 \text{VI} \quad 5a^m + 8b^n \\
 3a^m - 2b^n \\
 \hline
 15a^{2m} + 12a^m b^n \\
 - 10a^m b^n - 16b^{2n} \\
 \hline
 15a^{2m} + 14a^m b^n - 16b^{2n}
 \end{array}$$

Die neue Methode der Differenzialrechnung ist
 eine zu der Methode der Differenzialrechnung
 gehörige Erweiterung.

Die neue Methode der Differenzialrechnung ist
 eine zu der Methode der Differenzialrechnung
 gehörige Erweiterung.

Die neue Methode der Differenzialrechnung ist
 eine zu der Methode der Differenzialrechnung
 gehörige Erweiterung.

Wenn man die Summe zweier Zahlen mit ihrer
 Differenz multiplicirt, so gibt das Product den

Unterschied der weiten Potenzen dieser Zahlen.

Division der Potenzen

1. Wenn die zu dividierende Potenz eine Vielfache
Wurzel haben, so kann man die Division mit einer
höheren machen. Nimm. z. B. a^{10} dividirt man das durch
 6^{12} so gibt die Zahl $a^{10} : 6^{12}$ oder $a^{10}/6^{12}$.

2. Wenn die zu dividierende Potenz größer ist, als
die ^{Wurzel} so macht man den Quotienten gefunden, und wenn die
Wurzel nicht aufsteht, und ist eine Geometrie
gibt, und ist die Differenz der Geometrie
die Division nachgekommen ist dividirt durch die
ist. z. B. $a^{10} : a^5 = a^5$.

$a^3 : a^5 = a^2$ d. h. mit andern Worten, wenn man
 den Exponenten des Divisors weniger als den Dividenden
 abnimmt, so in der That bleibt die Zahl d. Differenz;
 den Quotienten als Exponenten.

2. Wenn man will, nachzuweisen, daß die angegebenen
 Potenzgesetze gleichsam allgemein gelten, so gibt die
 folgende kleine Probe.

$$\text{Es ist } a^m : a^m = a^{m-m} = a^0$$

Da aber $a^m : a^m = 1$ ist, mit jenen Größen sich selbst
 einmal aufhebt, so wird auch $a^0 = 1$ und man sagt jenen Größen
 auf der Nullpotenz ist die Potenz gleich. z. B. $100^0 = 1$
 $1200^0 = 1$.

3. Um die Umkehrung d. d. Regel zu finden, so man
 sagt

$$a^2 : a^5 = \frac{a \cdot a}{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a} = \frac{1}{a \cdot a \cdot a} = \frac{1}{a^3}$$

$$8.1000 + 7.100 + 6.10 + 4.1 + 3.0.1 + 2.0.01 + 5.0.001 \text{ oder}$$

$$8.10^3 + 7.10^2 + 6.10^1 + 4.10^0 + 3.10^{-1} + 2.10^{-2} + 5.10^{-3}$$

Auffgaben kann man so zusammen mit den übrigen Lehrsätzen
und die Lösung ist dann, man hat solche Lehrsätze zusammen
für einen Lehrsatz haben.

Division.

Bruchstabsgrößen durcheinander zu
dividieren.

1. Wenn der Divisor und der Divident kein Buchstaben
enthalten, dann kann man sich leicht helfen, in Divisionen ist
mühsam und schwierig, sondern man kann die Division
zu Divisionen setzen $y = 3x$ oder $3x = y$ oder $y = 3x$ oder $y = 3x$
man hat den Divident durch $y + 0 = m = 3x + 0 = m$
 $y + 0 = m$

2. Löst man die Division mit einem Buchstaben,

gefundenen Quotienten den ganzen Divisor, subtrahiert
 diese Produkt von dem Dividenden und lässt so lange fort
 bis sich der Divisor selbst oder ein Rest abhebt, der
 häufiger oder seltener vorkommt.

I $a \overline{) 3a + ab - ac^2 - ad} = 3 + b - c^2 - d.$
 $\underline{+ 3a + ab + ac^2 + ad}$

II $-3b \overline{) 15ab - 6b^2 + 3b^4 - 12b^6} = -5a + 2b - b^3 + 4b^5 - \dots$
 $\underline{+ 15ab - 6b^2 + 3b^4 - 12b^6}$

III $a+b \overline{) a^2 + 2ab + b^2} = a+b$
 $\underline{+ a^2 + ab}$
 $\quad + ab + b^2$
 $\quad \underline{+ ab + b^2}$

IV $a+b \overline{) a^2 - b^2} = a-b$
 $\underline{+ a^2 + ab}$
 $\quad - ab - b^2$
 $\quad \underline{+ ab + b^2}$

$$a - 1 \cdot \frac{+ae^5 - a}{+ae^5 - ae^4} = \frac{+ae^4 + ae^3 + ae^2 + ae + a}{e - 1}$$

$$\frac{+ae^4 - a}{+ae^4 - ae^3}$$

$$\frac{ae^5 + ae^4 + ae^3 + ae^2 + ae - ae^4 - ae^3 - ae^2 - ae - a}{ae^5 - a}$$

$$\frac{+ae^3 - a}{+ae^3 - ae^2}$$

$$ae^5 - a$$

$$\frac{+ae^2 - a}{+ae^2 - ae}$$

$$\frac{+ae - a}{+ae - a}$$

$$\frac{+}{+}$$



Lehre
vonden

Verhältnissen und Proportionen.



Proportionen.

I.

§ 1

4. Von Anfalltheil der Anzahlung zu einem Zahlenmodulus bestimmt
mindestens minimal in einem größeren, als in einem anderen ist, heißt
eine arithmetische Anfalltheil der Anzahlung, in Zahlen
selbst nur die in Gleichung und in der
Subtraction der Anzahlung heißt die Differenz der
Anzahlung. Die Anfalltheil der Anzahlung in der
Anzahlung bestimmt die Anzahlung der Anzahlung der
Anzahlung — z. B. 25 — 15 enthält die Anfalltheil der
Anzahlung der Anzahlung. Man findet 25 der 1. und
Anzahlung 15 der 2. und der 3. Anzahlung. Die
Differenz ist 10.

ungetreut 5 10 gewantailig G: 20.

S. 2.

Folgerungen für das arithmetische
Verhältniß.

- a) Die arithmetischen Verhältnisse der Glieder sind in Differenz = 0
- b) Die arithmetischen Verhältnisse der Mitglieder einer Geometrie zum Plinianum ist die Differenz der Verhältnisse der Glieder zu den Gliedern der ersten Reihe. z. B. 15. 10 = der Differenz 5.
- c) Wenn das Verhältniß einer Plinianum zu einer Geometrie z. B. 1. 14, so könnte sie auch 14. 1 abgezogen werden, was überflüssig ist das Geometrie zu sagen man wird.
- d) Das arithmetische Verhältniß der Verhältnisse der Glieder

und gefunden, wenn man Parzelle Blind zur Differenz setzt
Diat. 3. L. 42 - 19 = 23 = 3te Differenz. 2te Differenz + 1te

$2^{\text{er}} \text{ Bin.} = \text{Bin.} 1^{\text{er}} \text{ Bin.} 2.3 + 19 = 12.$

e) Vol. 2. = Gliedern in der Reihe Maschke'scher Form
gefunden. $\frac{1}{2}$ Gliedern in der Differenz abgeleitet

3. L. 12 - 19 = 23 unisobique 12 - 23 = 19.

Folgerungen für das geometrische
Verhältniß.

2. Ihre gerühmte Kasse ist in der Gasse 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844

Regnum = i. g. L. 20: 20 = 1; q: q = 1.

b) Die grauweißen Kieselsteine des Augerhütten
nach Größenzunahme, kleineren ist das Gefüge

ut m d r u i n n i e n g o r u z n Z a f l v d r a t i e n m n e u i f t h

haben, so nennt man sie gleiche Kreisflächen. z. B. Ist
 ein Kreisfläche 30 & 15 dann Kreisflächen 22. Ist gleich. Da
 bei In In Differenz 15 gemein haben. Also 24 15 ist
 ein größerer Kreisfläche 36 = 39, weil die Differenz 9
 größer ist als 3.

b. Man die gleiche kreisförmigen Kreisflächen zwei mal
 gleichförmigen machen man so sehr leicht nur
 kreisförmigen Proportionen. z. B. 15 - 30 = 4 - 22.

c. Jede kreisförmigen Proportion muß 4 Glieder haben.
 welche man das 1^{te}, 2^{te}, 3^{te} und 4^{te} Glied nennt. z. B.

$$15 - 9 = 10 - 4$$

d. Jede kreisförmigen Proportion muß In zwei
 der beiden äußeren der Summe der beiden äußeren
 gleich sein.

1. Für Allgemeinere kann die Folge so bestimmt werden, dass
 das 1^{te} Glied ist immer die Summe aus dem 2^{ten} Glied und
 aus der Differenz; das 3^{te} Glied immer die Summe aus dem
 4^{ten} Glied und der Differenz.

2. Müssig sich in jedem beliebigen Proportion, das 1^{te} Glied
 zu dem 3^{ten} = das 2^{te} zu dem 4^{ten}, min. sich das 2^{te} zu dem 4^{ten} = max. sich
 das 1^{te} zu dem 3^{ten} = das 2^{te} zu dem 4^{ten}. In
 gemeinen Differenz. Man kann daher die Formel machen
 in $(19+4)$ zu $19 = (8+4)$ zu 8 .

Man ist zu unterscheiden Glieder einer Pro-
 portion, ob sie arithmetisch oder geometrisch sind, so leicht
 die Differenzen, min. und max. Proportion.

$$\begin{array}{r}
 3. L. 18 - 12 = 10 - 4 \\
 11 - 9 = 7 - 5 \\
 29 - 25 = 17 - 9
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 18 - 12 = 10 - 4 \\
 11 - 9 = 7 - 5 \\
 7 - 3 = 3 - 1
 \end{array}$$

S. 3.

Bei 2 gegebenen Gliedern a und b Langantia a und b
 zu finden $30 - 19 = 24 - 4 = 24 + 19 = 30 = 13$
 Es werden also in diesem Falle die beiden mittleren
 Glieder addirt, und das 1^{te} subtrahirt. In d. d. d.
 man gibt das 4^{te}.

Viergliedern Regel.

Wenn das fünfte Glied a und b gegeben ist, so
 ziehe man von der Summe der beiden mittleren
 das bekannte Rückwärts ab, so erhält das fünfte
 nur inneres Glied, so subtrahiere man von der
 Summe der äußeren Glieder das gegebene inneren
 und die Differenz wird, so ist das fünfte
 Glied gefunden.

Mane heißt eine arithmetische Progression richtig, wenn die
benachbarten Glieder gleich sind, und die mittleren
Glieder, sind die mittleren arithmetischen Progressionsmittel
zwischen $8 - 12 = 12 - 16$ gemächlich ausgeschrieben
 $8 - 12 - 16$.

Voll Satz zwischen 2 gegebenen Zahlen die mittleren
arithmetischen Progressionsmittel gefunden werden,
so sind die neuen Zahlen die Mittel zwischen 2.

Grundlehren der geometrischen Proportion.

S. 1.

Von Man wird geachtet, dass das Verhältnis
gleich ist, wenn die Größen gleich sind, gefunden

fündener aus dem Gießbe. der Legierungsb. 10 Pf. 3. L.
 von Mangel aus 24: 8 der Legierungsb. 3 oder aus 3: 4 der Mangel-
 = dem Legierungsb. 3.

Haben 2 gewöhnliche Kreisflächen innerhalb einer Ellipse
 Summen ihrer sin gleich Kreisflächen 24:9 = Drei
 Kreisflächen 30:10. Da ja das Dreiecksumme 3 ist.
 a) Wenn 2 gleiche gewöhnliche Kreisflächen durch
 das Zentrum der Ellipse verbunden sind, so ist das,
 ein gewöhnliche Permutation z. L. 48:6 = 24:3.
 Sind 8 der Summe überall 8. Die Zahl und
 Summe der Glieder ist diese Permutation
 mit den verschiedenen Zahlen.
 b) Indes gewöhnliche Permutation fort folgenden
 Eigenschaften. Das Produkt aus drei
 Gliedern muß dem Glied sein das Produkt

und Innenmittellinien gleich z. L. 3:15 7:35. $3 \times 35 = 7 \times 15$.

Der Grundfuss ist folgender:

Auf abigau ist $3 = 15 \times \frac{3}{15}$ und $7 = 35 \times \frac{7}{35}$.

Darüber $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ und $\frac{7}{35} = \frac{1}{5}$ ist, so wird $3 = 15 \times \frac{1}{5}$ und $7 = 35 \times \frac{1}{5} =$

und die Proportion ist folgender: $15 \times \frac{1}{5} : 15 = 35 \times \frac{1}{5} : 35 =$

$3:15 = 7:35$, bildet man sich das Produkt der äusseren

Glieder und inneren, so ist $(15 \times \frac{1}{5}) \times 15 = (35 \times \frac{1}{5}) \times 35$, da beide

Produkte aus gleichen Faktoren bestehen.

d.) Für Allgemeine kann dieselbe folgender Gestalt
hervorgehoben werden:

Die letzten Glieder einer geometrischen Progression
mit Produkt aus den 2 letzten Gliedern der Progression,
in der 3te Glied aber ein Produkt aus den 2 letzten Gliedern
inneren derselben Progression ist, so besteht das Produkt

mit dem 1^{ten} und 3^{ten} Glind, und dem facktenen; 2^{tes}
Glind, Geomet und 4^{tes} Glind; Der Productat von
mittlern Glindern nicht als aban die facktenen;
4^{tes} Glind Geomet und 2^{tes} Glind, mehr die in unklaren
sind. Auffindem laßt sich die facktenen folgen die facktenen
bezeichnen:

Rück der Proportion $3:15 = 7:35$ geht hervor, daß die Quoten
entweder $\frac{3}{15}$ und $\frac{7}{35}$ gleiches Maß haben. Leicht kann man sich
überzeugen, daß die Quoten $\frac{3}{15}$ und $\frac{7}{35}$ gleiches Maß haben.
oder $\frac{3 \times 35}{15 \times 35} = \frac{7 \times 15}{35 \times 15}$ folglich auch $3 \times 15 = 7 \times 35$ sein
und gleiches Maß haben. Leicht kann man sich
überzeugen, daß die Quoten $\frac{3}{15}$ und $\frac{7}{35}$ gleiches Maß haben.

52.

Wenn man beide Gläser mit Wasser füllt
und sie mit dem unedigen Gas anfüllt

und dividirt, so bleibt dessen Maßfünfundachtz. L. 18:6

der gegebenen Maßfünfundachtz. L. 18:6

$$6 \times 3 = 18 : \frac{6}{2} = 3.$$

In jeder geometrischen Progression maßfünfundachtz. L. 18:6
zum 3ten, mit sich selbst 2ten zum 4ten maßfünfundachtz.

e. In jeder geometrischen Maßfünfundachtz. L. 18:6
mit geometrischen Längenz. L. 18:6, mal neunzehn
kleineren Längenz. L. 18:6 mal neunzehn
kleineren Längenz. L. 18:6 mal neunzehn

Man kann das 1te und 2te L. 18:6 und 3te L. 18:6 und
4te L. 18:6 und 5te L. 18:6 L. 18:6 mit demselben Zahl setzen, wenn
das die Progression gestärkt wird, das heißt auf die
sich geometrischen Längenz. L. 18:6 mal neunzehn
als Gegensatz von 1ten und 2ten und 3ten und 4ten
mal die L. 18:6 mal neunzehn

d. Zuvorst brüht das Pflanzensamen in dem Progenitor
 befruchtete Eizellen in einer ganz bestimmten
 von der Progenitor zu stamm. Man darf sich mit
 dem magelhaften Samen dieser Eizellen nicht
 mischen, falls man sich nicht gleichmütig lizenzen, wobei
 man immer unter dem die Kulturen steht.

Es ist die Progenitor $\frac{2}{3} : 6 = 8 : 12$

$$2 : 6 \times 3 = 8 : 12$$

$$2 : 18 = 8 : 12$$

$$2 : 6 = 8 \times 3 : 12 = 2 : 6 = 24 : 12$$

Man hat also in der Progenitor
 geben, sind die manmütig lizenzen alle aus der
 also die mit dem Samen alle 2. und 3. bei
 und 3. bei, so bilden auf diese Produkte man

nicht nur Proportion, sondern auch zusammengesetzt
 und man kann das Produkt der Proportionen
 das gegebene Proportionen gleich ist. z. B.

$$18 : 3 = 54 : 9$$

$$8 : 4 = 10 : 5 \text{ ist auch}$$

$$144 : 12 = 540 : 45.$$

Auf gleiche Weise können unendliche Proportionen
 gegeben sein, und sie in eine einzige zusammenfassen.
 Wenn 2 Proportionen gegeben sind, so bilden sich
 diese Quotienten aus gleichen und ungleichen Gliedern
 und man kann Proportionen, mal fünf
 ist eine Weise darzustellen.

S. 3.

Wenn man nun geantworte Proportion

nur auf dem Glind steht, so sind die man das
Produkt aus dem mit Wasser Dünst das man aus dem
niedrigen, steht aber nicht mehr, so sind das pro.
Dükt. Das niedrige, Dünst das man aus dem mit Wasser
sind die, mal mit anderen Worten freist, zu
zugebener Glind man die 4^{te} gewöhnliche
Produktzahl zu finden.

Man in der gewöhnlichen Produktion
in der man mit Wasser Glind anheißt, so
freist man die 4^{te} gewöhnliche Produktion,
und man macht die 4^{te} mal die in der man
mit Wasser Glind anheißt, die 3^{te} gewöhnliche
Produktzahl zwischen der 1^{ten} und 2^{ten}
und die in der, die 4^{te} Produktion das
Produkt der in der niedrigen Glind man

Produkt des mittlern in sich selbst gleich ist,
 und man ~~erhält~~ ein falsches Produkt das Quadrat
 dieses Glieds nimmt, so ist für das Produkt des
 äußern Glieds das Quadrat des mittlern Glieds
 gleich.

Folgende geometrische Proportionen müssen sich in
 Same die Differenzen sein 1^{te} und 2^{te} Glied,
 so zu dem 1^{ten} oder 2^{ten} in sich in Same sein
 Differenzen sein 3^{te} und 4^{te} Glied zu 3^{ten} und
 4^{ten} maßlich.

Wenn folgende Proportionen gegeben sind

$$15:3 = 84:A$$

$$12:4 = A:9$$

$$26:2 = 4:z \text{ man in die Gleich. setze } A, 9, z \text{ statt}$$

in die Gleich.

malis auf unbekannt sind, so wird das Maß zu
 durch gefunden, das die drei gleichartigen Glieder
 miteinander multipliziert, nach dem aufgefundenen
 gesetzten Proportionen herauskommt.

$$15 \times 12 \times 26 : 3 \times 4 \times 2 = 84 \times x \times y : x \times y \times z =$$

$$4680 : 24 = 84 \times x \times y : x \times y \times z \text{ oder auch}$$

das Aufschreiben $x \times y$ in dem Glied abgetrieben

$$\text{gibt: } 4680 : 24 = 84 : z$$

$$z = \frac{24 \times 84}{4680} = \frac{2016}{4680} = 0,4307$$

August
 Min

Lehre

von der

Ausziehung
der

Quadrat- & Wurzel.

A large, ornate decorative flourish consisting of several overlapping loops and a long, wavy tail that curves upwards.

1841

Leber

von der

Leber

Quadrat "W" 1076

John

Quadrat. Wurzel.

S. 1.

Ein Zahl mit sich selbst, stündlich liegend gibt die 2^{te} Potenz
Das selbe, mehrmalen mit einem besondern Maas
Das Quadrat, die mit sich selbst, stündlich liegenden Zahl
aber die Quadrat. Wurzel nennt. z. L. $8 \times 8 = 64$

$64 = \text{Quadrat. } 8$

$8 = \text{die Quadrat.}$

Wurzel

Das eine gegen einem Zahl die Quadrat. Wurzel
zu ziehen, heißt eine Zahl ziehen, mehrmalen mit
sich selbst, stündlich liegend die gegebene Zahl zum Produkt
fakt.

Das Ziehen für die Abziehung der Quadrat. Wurzel ist.

Man nennet eine gegebene Wurzel nichtfälig, wenn sie
 eine, n fälig, wenn sie n Ziffern hat.
 S. 2

Wenn eine Wurzel aus 2 Theilen besteht und man es
 setzt zum Quadrate, so besteht dasselbe

a.) Aus dem Quadrate des 1ten Theils

b.) Aus dem doppelten Producten des 1ten und 2ten Theils

c.) Aus dem Quadrate des 2ten Theils

z. B. $a+b$ sind die gegebenen Wurzeln aus a sey
 b der 2te Theil, dasselbe, so beziehet

$$\begin{array}{r} \text{sey } a+b \\ \underline{a+b} \\ a^2+ab \\ + ab+b^2 \\ \hline a^2+2ab+b^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} a^2 = 3600 \\ 2ab = 480 \\ b^2 = 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 60+4 \\ \underline{60+4} \\ 3600+240 \\ + 240+16 \\ \hline 3600+480+16 \\ \hline 4096 \end{array}$$

Fig. 2. Folgende Mäzgele ist das Quadrat des 9ten Teils
 Das Quadrat eines Zahlenbandes ist 81 in der Grundzahl
 seiner in der 9ten Stelle.

Da dieses 9ten Teilband in der 9ten Stelle steht
 das Quadrat aus 9000 ist 8100 ist das Quadrat
 des 9ten Teils ist 81 in der 100ten Stelle.

Das Doppelte Produkt ist ein Produkt aus einem
 Zahlenbande und einem Zahlenbande 81 ist ein
 in der 9ten Stelle in der 9ten Stelle.

Das Quadrat des 9ten Teils ist ein in der 9ten Stelle
 in der 9ten Stelle ist ein in der 9ten Stelle
 Zahlenbande das Quadrat des 9ten Teils ist ein in der 9ten Stelle

$$9 = 9 \times 9 = 81 \text{ ist.}$$

Man sieht die Zahlenbande des 9ten Teils ist ein in der 9ten Stelle

man das Aufsteigen der Lücken in Klassen und so
aufsteigen 2 Klassen und die Zahl der Wurzeln
findet.

2.) Man fängt an mit einem kleinen Quadrat, welches man dann absteigend
man kann, bis es endlich davon ab und setzen sein
Quadrat, Wurzel als die Wurzelzahl zur ersten der
gegebenen Zahlen abnimmt, absteigend bis
3. Man fängt an mit der ersten Zahl, die man in dieser Klasse
man das Dargestellte Produkt in dieser Klasse absteigend
setzt, bis man das Produkt in dieser Klasse die folgende
Ziffer der Zahl, so muß ^{in der} die Zahl erhalten
man das Dargestellte Produkt man hat die Zahl in der
Zahl erhalten sein.

4. Abkürzung man dividiere die Minuzallzahl mit Terminant
 Damit die zufallene Zahl seine Quotient der
 2^{ten} Minuzallzahl geben, dann man mit 2 den
 2^{ten} Terminant, seine Quotienten aus lassen.
 Wenn 2^{te} Minuzallzahl unmöglich ist man mit dem Terminant
und zieht das Produkt von Terminant ab.

5. Zeigt man nun den allseitigen Anstieg
 in der Ziffer der Zahl, so muß in dem Maß sich die
 Anzahl der Quadrate n^2 der Seitenzahl n zeigen.
 Man nehme die 2. und 3. Zeile der Quadrate,
 so wird die Anzahl der Quadrate als die Zahl
abgezogen man die 4. oder die 5. Zeile
kleiner als die 3. oder die 4. Zeile.

Der rechte Winkel ist in jedem rechtwinkligen
Dreieck ein Quadrat.

6.) Im 2ten Falle aber muß man das gesuchte
Quotienten finden, um hier leicht zu finden
und mind. dann mind. in No. 5 benutzend
lassen, so lang bis das Quadrat der 2ten Zahl
von der Zahl, die in No. 5 benutzend gefunden
wird, abgezogen werden kann.

Im 3ten Falle zeigt die Probe, daß die gesuchte
Wurzel jener ist, dann Quadrat der gegebenen
Zahl ausrechnen, damit und das gebliebene
Rest zeigen und die, so muß die aufsteigend
Zahl als Resultat herausfallen.



Beispiel.

Es soll aus der Zahl 184 die Wurzel gezogen werden.

$$\sqrt{184} = 13.767$$

$$a^2 + 2ab + b^2$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ \underline{169} \\ 15 \\ \underline{154} \\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ \underline{169} \\ 15 \\ \underline{154} \\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ \underline{169} \\ 15 \\ \underline{154} \\ 4 \end{array}$$

Geometrisch

Bestimmung der Theile der Quadrat. Zahlen mehrzifferiger Wurzel.

- Das Quadrat einer 3 stelligen Wurzel besteht aus 5 Theilen.
1. Das Quadrat der ersten Stelle
 2. Das Doppelte Produkt von der ersten Stelle in der 2^{ten}
 3. Das Quadrat der 2^{ten} Stelle
 4. Das Doppelte Produkt aus der Summe der 1^{ten} und 2^{ten} Stelle in der 3^{ten}
 5. Das Quadrat der 3^{ten} Stelle

Das Quadrat einer vierstelligen Wurzel besteht aus folgenden 7 Theilen:

1. Aus dem Quadrate der ersten Stelle
2. Aus dem Doppelten Produkt der 1^{ten} in der 2^{ten} Stelle
3. Aus dem Quadrate der 2^{ten} Stelle

gammiles 2

4. Aus dem Dogenstein Produktum der Summe der ersten und 2ten Spiel in der 3ten

5. Aus dem Quadrate der 3ten Spiel

6. Aus dem Dogenstein Produktum der Summe der ersten, zweiten, und dritten Spiel in der 4ten

7. Aus dem Quadrate der 4ten Spiel.

Letztendlich man die bis jetzt gefundenen Summen der ersten Spiel der Quadrate von 2. 3. und 4ten Spieligen Quadrate Märgeln, so ist klar, daß für jedweden Märgel können die ersten Spiel 2. Rück zum Quadrate kommen.

weil die Dogenstein Produktum der Summe aller nun gefundenen Spiel in der ersten und 2ten Spiel Quadrat ist die ersten Spiel.

So ist es klar, daß diese Spiel der Quadrate, so alle nun gefundenen Märgel heißt nun kommen.

Bestimmung

der
Wurzel. Theile aus vielziffrigen
Zahlen.

1. Aus dem bis zur Aufzählung geht die Wichtigkeit der
folgenden Regeln hervor.

Nachdem die gegebenen Zahl zuerst bekanntes Theil
an der Aufzählung gegen die Lücke in Klaffen
getheilt und die Zahl der Theilzahl bekannt
ist, teilt man die Summe in Lücken ab, welche
als Lücken bei Auflösung der Theilzahl dient.

2. Nach dem man die größten Quadrat aus den
Lücken Klaffen herausnimmt, setzt man die
Theilzahl als neue Theilzahl.

primus

3. Stund man zu demselben 2 Zahlen kommen. Man ist die Zahl der
Ziffern der Zahl und dividirt mit dem doppelten aus der
Mittelzahl in dieser ganze, so ist der Quotient der
2^{te} Mittelzahl. Man will die 3^{te} Zahl mit dem doppelten
aus der Zahl und in der Zahl das doppelte dem dividirt man ab.
4. Zu dem in 3 Zahlen kommen. Man stund man die Zahl der
Ziffern der Zahl bilden das Quadrat der 2^{ten} Zahl der
Mittel, zieht man diesen ganzen ab, so ist man die
Abzugssatz zu kommen, der 2^{te} Mittelzahl der 3^{ten} Zahl.
Man diesen ab nicht gezogen, so ist 3 dieser Mittel
Zahlen man findet man dividirt man den
6. Stund zu diesem in 3 Zahlen kommen. Man ist die Zahl der
Ziffern, so dividirt diese ganze das doppelte Produkt aus der
Summe der 1^{ten} und 2^{ten} Zahl in dem 3^{ten}.

Dividirt man mit dem Duggallum das bey dem Muzgal
Spiel in dieser Ordnung, so gibt das Quotient dem 3ten Spiel der
Muzgal, welches man mit dem Divisum multipliziert, um
dieses Produkt man dividirt abzugiehn.

§ Zu dem bleibenden Rest nicht mehr die folgenden Ziffern
das Zahlen und zieht man diesen Ordnung das Quadrat des
3ten Spiels ab, man sieht dem an, ob das Muzgal Spiel aufsteig
oder zu groß ist für den mehr oder weniger letztem
falls letztem Muzgal Spiel man dividirt man den Rest.

§ Zu dem in Sygallabnum Rest kommt man da die
folgenden Ziffern das ist ist man lässt nach dem
3. 4. 5. 6. Sygallabnum Regel fort, die übrigen
Muzgal Spiel zu suchen sind die neuen folgenden Divisionen
jeweils mit dem Duggallum Produkt man mit dem Summe

Key's pick.

$$\underline{\underline{a^2 + 2ab + b^2}}$$

$\frac{73}{104} \cdot \frac{19}{104} = \frac{85}{\alpha}$

$\alpha^2 = 64$

$2a \begin{array}{r} 94 \\ 16 \end{array}$

$2ab \ 80$

$b^2 \begin{array}{r} 144 \\ 25 \end{array}$

$2(a+b) \begin{array}{r} 1194 \\ 140 \end{array}$

$2(a+b)c \begin{array}{r} 190 \\ 104 \end{array}$

$c^2 = \begin{array}{r} 104 \end{array}$

$2(a+b)$

$2(a+b).$

α
 $28/44/64/84 = 50329$
 $a^2 = 25$
 $2a = 10$
 $2ab = 38$
 $b^2 = 9$
 $2(a+b) = 106$
 $2(a+b).c = 152$
 $c^2 = 4$
 $2(a+b+c) = 11064$
 $2(a+b+c).d = 9576$
 $d^2 = 81$
 $50243 \text{ etc. } 2nd$

ALSTZESZ

der Quadrat. Wurzeln durch Annäherung.

S. 1.

Entstehung und Begriff der Irrationalzahlen.
Man drückt sich die ersten 10 ganzen Zahlen und
die ersten zehn Quadraten ab

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

1. 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64. 81. 100 und es sind

zwischen 2 unmittelbar aufeinander folgenden Quad.
raten eine mittlere Zahl. z. B. zwischen 4 und 9.

Die Zahl 58, sucht man die Länge: Was ist die Wurzel aus
58?

Da 58 & 59. 49 aber kleiner als 64 ist, so muß 58 größer
 als 49 und kleiner als 81 sein, müßte also zwischen 49 und 81
 liegen, so müßte in 49, 81 ein größeres Quadrat sein.
 Man findet aber kein vollkommenes Quadrat, müßte also in
 diesem 90 zwischen vollkommenen Quadraten liegen und
 ist ein Quadrat. Wurzeln Irrationalzahlen sein müssen.

S. 2.

Die Quadrat. Wurzel unvollständiger Quadrate
durch Annäherung zu finden.

Man kann leicht dadurch zum Quadratinfakt, daß
 Zahlen und Potenzen quadrieren müssen, so findet man
 und umgekehrt die Quadrat. Wurzeln und leicht dadurch
 daß man aus Zahlen als Potenzen die Wurzeln gezogen
 mind. z. B. $\sqrt{\frac{49}{100}} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{100}} = \frac{7}{10}$

$\sqrt{\frac{11}{20}} = \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{20}}$ in diesem Falle ist $\sqrt{11}$ als $\sqrt{11}$ eine Irrationalzahl.

Will man z. B. $\sqrt{5}$ mit $\sqrt{100} = 10$ finden, so
setzt man $\sqrt{5} = \sqrt{\frac{500}{100}} = \frac{\sqrt{500}}{10}$.

Findet man das $\sqrt{500}$ in $\sqrt{500}$ teilbar, so
müßte man $\sqrt{500}$ dividieren, und man setzt $\sqrt{5}$
einmal in $\sqrt{500}$ ein, und man erhält $\frac{1}{10}$ als
Resultat.

Gründe für die allgemeine Regel:

Man nehme nun ein beliebiges Quadrat a^2 in
Wurzel aus, und man erhält a , so man

und diese Zahl a mit $\sqrt{a^2}$ kann man $\sqrt{a^2}$ als

mit $\sqrt{a^2}$ dividieren, und man erhält $\frac{a}{a} = 1$ als

Resultat, und man erhält $\frac{a}{a} = 1$ als

gemüßliche Weise.

Beispiele.

Die Wurzel aus 8 ist auch 2,8284, falls man sie findet.

$$a^2 + 2ab + b^2 = 8,00000000 = 2,8284$$

$$\begin{array}{r} a^2 = 4 \\ 2a(4) = 80 \\ ab = 32 \\ b^2 = 64 \\ 2(a+b) = 56 \\ 2(a+b) \cdot c = 112 \\ c^2 = 16 \\ 2(a+b+c) = 564 \\ 2(a+b+c) \cdot d = 4512 \\ d^2 = 64 \\ 2a(64) = 24160 \\ (5656) \\ 22624 \\ 15360 \\ e^2 = 16 \\ 15344 \text{ alle } \text{Ans.} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 113136 \\ 226272 \\ 56568 \\ 226272 \\ 56568 \\ 499984656 \\ 15344 \\ 8,00000000 \end{array}$$

Probe.

Die Binomialformel 12.7. auf 4. Binomial, stellen zu fünf.

$$a^2 + 2ab + b^2$$

$$\frac{112694}{112694}$$

$$2a \quad 24$$

$$b^2 \quad 1$$

$$2(a+b) \quad (22)$$

$$2(a+b) \cdot c \quad 44$$

$$c^2 \quad 160$$

$$1560$$

$$2(a+b+c) \quad (224)$$

$$2(a+b+c) \cdot d \quad 1344$$

$$d^2 \quad 2160$$

$$36$$

$$2(a+b+c+d) \quad (2252)$$

$$2(a+b+c+d) \cdot e \quad 20268$$

$$e^2 \quad 9720$$

$$81$$

$$2(a+b+c+d+e) \quad (22538)$$

$$2(a+b+c+d+e) \cdot f \quad 20152$$

$$62380$$

$$f^2 \quad 16$$

$$62396 \text{ rest } 16$$

Sechs

Quadrat Wurzeln aus gemeinen Brüchen.

Will aus einem gemischten Laufs in Quadrat,
Münzfuß gegeben werden, so nimmst du den Laufs
symmetrischen Teil.

Wenn z. B. dieser Münzfuß 12 ist, so ist der Laufs
der Flucht der Laufs z. B. $\sqrt{\frac{1}{12}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{2,64}}{\sqrt{3,464}}$

Den ich das Münzfuß z. B. 12 ist
Vergleichen mit dem Laufs z. B. 12 ist
ist, so kann man das Laufs z. B. 12 ist
Quadrat Wurzeln aus gemeinen Brüchen
nehmen, das man den Laufs z. B. 12 ist
gebenen Laufs mit einem Laufs z. B. 12 ist
gibt, man den Laufs z. B. 12 ist

bleibt, sein Stamm aber in ein vollkommenes Quadrat
 zu verwandeln.

$$\text{Beisp. 2. } \sqrt{\frac{9}{11}} = \sqrt{\frac{9 \times 11}{11 \times 11}} = \frac{\sqrt{99}}{11} = \frac{\sqrt{99}}{\sqrt{121}} = \frac{\sqrt{99}}{11} =$$

$$= \frac{8,74}{11}$$

$$\text{Beisp. 3. } \sqrt{\frac{8}{13}} = \sqrt{\frac{8 \times 13}{13 \times 13}} = \frac{\sqrt{104}}{13} = \frac{10,198}{13};$$

man construirt den Zähler des Bruchs dadurch zu einem
 vollkommenen Quadrate, den Nenner des Bruchs als

Stamm desselben mit dem Zähler multiplicirt.

Man hat die Wurzelbrüche in Quadrate, Wurzeln zu ziehen
 versteht man nicht bei ganzen Zahlen, nicht bei Brüchen
 Wurzelbrüche, sondern es ist einmal gemischt in allen
 den Fällen, und die Zahlen in Klassen eingeordnet,
 muß man die Zahl für die Wurzel, die Zahl für den
 Stamm setzen.

Originalbrief, dessen Inhalt uns vorzulegen ist, ist
manus.

Wie man zu 2 gegebenem Zahlen a und b den arithmetischen
Mittelwert x findet, ist bekannt. Die Aufgabe aber: zu
2 gegebenem Zahlen a und b den geometrischen
Mittelwert x zu finden, kann nicht so leicht gelöst werden.

Nach L. Z. misst man a und b in einem gemeinsamen Maß
aus, und dann ist x die geometrische Mittelzahl.

$$8 : a = a : 29 \text{ folglich } a \times a = a^2 = 8 \times 29 = 232$$

$$a = \sqrt{232}$$

$$a = 15,23. \text{ Finis}$$

$$17 : a = a : 38$$

$$a^2 = 17 \times 38 = 646$$

$$a = \sqrt{646} = 25,416.$$



WURZEL.

von der

Auszichung

der

CUBIC = WURZEL.

2 15 02 22

perpetuum.

CUBIC

Cubic Wurzel.

S. 1.

Man kann nun zu zweimal mit sich selbst multipliziert,
wobei sich dann zum Suchen ergiebt, so sei es dieses Landstück
die 3^{te} Potenz oder die Wurzel der Cubus: Dieser Zahl,
mal man in Länge auf die Wurzel die Wurzel der 3^{ten}
Potenz oder die Cubus, Wurzel um $z. L. 4 \times 4 \times 4 = 64$ - Dann
Wurzel aus $4 \cdot 4$ = der Cubus, Wurzel aus 64.

Die nun gegebenen Zahl die Cubus Wurzel ziehen, sei es
sonst als eine Zahl sein, mal zu zweimal mit sich selbst
multipliziert, diese Zahl wieder herausbringen. Da die Cubus
Wurzel, die Wurzel der 3^{ten} Potenz ist, so setzt man nun
sich zu bequemen, die Ziffer 3 in die Öffnung der Wurzelzeichen.
 $z. L. \sqrt[3]{64} = 4$.

S. 2.

Bestandtheile des Würfels zweiziffriger Wurzel.

Man merke nun zweiziffrige Wurzel zum Cubus
erfolgt, sonst fällt dieser folgende 4. Theil:

1. Der Cubus des ersten Theils

2. Das 3fache Produkt des Quadrats des ersten Theils
in den zweiten

3. Das 3fache Produkt aus dem ersten Theil in das
Quadrat des 2ten

4. Der Cubus des 2ten Theils.

Diese 4 Theile sind zusammenzusetzen, das 3te
zweiziffrige Wurzel $a + b$ 2mal mit sich selbst zu multiplizieren
gibt man.

$$\begin{array}{r}
 a+b \\
 a+b \\
 \hline
 a^2+ab \\
 +ab+b^2 \\
 \hline
 a^2+2ab+b^2 \\
 a+b \\
 \hline
 a^3+2a^2b+ab^2 \\
 +a^2b+2ab^2+b^3 \\
 \hline
 a^3+3a^2b+3ab^2+b^3
 \end{array}$$

Zur Erklärung in Zahlen. Wenn $a=50$, $b=8$
 Dingensbauzahl $58 = 50 + 8$

$$a^3 = 125000$$

$$3a^2b = 60000$$

$$3ab^2 = 9600$$

$$b^3 = 512$$

Es folgt $195112 =$ Dann Kubus von 58 sein.

Man kann daher den Kubus jedes zweifachen Zahlen
 Differenzial aus a und b bestimmen.

am B.

Zahl. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 Quad. 1. 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64. 81.
 Cubus. 1. 8. 27. 64. 125. 216. 343. 512. 729.

Und in Cubis, Wurzel aus 4, 5 oder 6 zifferigen
 Zahlen zu finden, sind aus, so sind die Klassen
 zu befolgen.

1. Man schreibe die gegebenen Zahl nach der ersten
 Lücke der Klassen, das die ersten Klasse 3 ziffern
 enthält.

2. Man ziehe die größte Cubus, welcher aus der
 ersten Klasse abgezogen werden kann, mit Schluss an d. n.
 salben ab, so ist sein Cubus die Wurzel der ersten 3 ziffern.

3. Der Rest Product 3 a² b ist die Hunderte aufsteigt.
 so setze man die Hunderte der gegebenen Zahl unter

Sie in 2. gestrichenen Lust, somit dieses Gange des Landrechts
3a² b² aufhalten.

4. Similitudine des ersten Lust 3. letzten Gange des 1. ten
Mangelstils: 3a² 3. in die massen aufhalten Lust, somit das
Quadrat des 2. Stils der Mangelstils, da 3a² b² sind 3a²
Similitudine zum Quadrat b² gibt.

5. Man bildet nunmehr das Landrecht 3a² bei Lust
zwischen ab und st² an dem 1. maigene Lust die folgende
Ziffer der 1. gestrichenen Lust, somit in diesem Gange des
Landrechts 3a² b² aufhalten sein.

6. Man nimmt daher dieses 3a² b² in Lust, zwischen ab
und st² an dem 1. Lust die folgende Ziffer der 1. Lust,
somit in diesem Gange des 1. ab 3a² b² aufhalten
sein. Daher bildet man nunmehr die Lust zwischen 3a² b² und 3a² b²

ab und ist, man hier fast leicht in gegebenen
 Zahl ein vollkommenes Cubus, dessen Wurzel man
 gefunden man wird.

$$\underline{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3}$$

$\sqrt[3]{6859} = 19$ $a^3 = 11$ $3a^2 = 58$ $3a^2b = 27$ $3ab^2 = 315$ $b^3 = 243$ 729 729	$\sqrt[3]{6859} = 19$ 19 19 361 3249 361 6859	$\sqrt[3]{6859} = 19$ { V. Wurzel $361 = \text{Quadrat}$ $6859 = \text{Cubus}$	$\sqrt[3]{6859} = 19$
--	---	--	-----------------------

$\sqrt[3]{59319} = 39$ $a^3 = 27$ $3a^2 = 324$ $3a^2b = 243$ $3ab^2 = 801$ $b^3 = 729$ 729	$\sqrt[3]{59319} = 39$ 39 39 1521 13689 45639 59319	$\sqrt[3]{59319} = 39$ Wurzel $1521 = \text{Quadrat}$ $59319 = \text{Cubus}$	$\sqrt[3]{59319} = 39$
--	---	--	------------------------

$$\underline{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3}$$

$$\sqrt[3]{491307} = 73$$

$$\begin{array}{r} a^3 = 343 \\ 155 \\ 3a^2 = 48 \\ 3a^2b = 144 \\ 110 \\ 3ab^2 = 108 \\ 27 \\ b^3 = 27 \end{array}$$

$$\sqrt[3]{941192} = 98$$

$$\begin{array}{r} a^3 = 926 \\ 2121 \\ 3a^2 = 243 \\ 3a^2b = 1944 \\ 1778 \\ 3ab^2 = 1478 \\ 512 \\ b^3 = 512 \end{array}$$

$$\sqrt[3]{874329} = 95 \text{ Manyr}$$

$$\begin{array}{r} a^3 = 857 \\ 1450 \\ 3a^2 = 243 \\ 3a^2b = 1215 \\ 2382 \\ 3ab^2 = 675 \\ 14070 \\ 125 \\ 1695 \text{ null } 2 \text{ null } 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8575 \\ 855 \\ 9025 = \text{Quadrat} \\ 95 \\ 45125 \\ 81225 \\ 857375 = \text{Cubus} \\ 16954 \text{ null } 2 \text{ null } 2 \\ 874329 \end{array}$$

Probe

Der Cubus einer ^{nicht} geradzähligen Wurzel besteht aus
folgenden 4 Theilen

1. Aus dem Cubus der ersten Zahl
2. Aus dem 3fachen Producte von dem Quadrate der
ersten Zahl in der zweiten
3. Aus einem 3fachen Producte von dem 1ten Theile
in das Quadrat der zweiten
4. Aus dem Cubus der 2ten Zahl
5. Aus dem 3fachen Producte von dem Quadrate der
ersten Zahl und 2ten Theile in der 3ten
6. Aus einem 3fachen Producte von dem 1ten
Theile und 2ten Theile in dem Quadrate der 3ten
7. Aus dem Cubus der 3ten Zahl

Wenn man beginnt die zifferngebundene 3 theilige
Cubic Wurzel dieser 4 Theile zusammen zu bilden

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\sqrt[3]{148/531/589} = 526$$

$$\begin{aligned} a^3 &= 125 \\ 3a^2 &= 205 \\ 3a^2b &= 150 \\ 3ab^2 &= 553 \\ b^3 &= 60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3(a+b)^2 &= 8112 \\ 3(a+b)^2c &= 48672 \\ 3(a+b)^2c^2 &= 5616 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c^3 &= 216 \\ 13ab &= 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3156 \\ 1052 \\ 2630 \end{aligned}$$

$$276676 = \text{Quadrat}$$

$$\begin{aligned} 526 \\ 1660056 \\ 1383380 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 145531576 &= \text{Cubus} \\ 13 &= \text{Ans} \end{aligned}$$

$$145531589$$

Probe

$$\sqrt[3]{148/119831/711} = 5291$$

$$\begin{aligned} a^3 &= 125 \\ 3a^2 &= 231 \\ 3a^2b &= 150 \\ 3ab^2 &= 811 \\ b^3 &= 60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3(a+b)^2 &= 75118 \\ 3(a+b)^2c &= 8112 \\ 3(a+b)^2c^2 &= 73008 \\ 3(a+b)^2c^3 &= 21105 \\ c^3 &= 12636 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3(a+b+c)^2 &= 839681 \\ 3(a+b+c)^2c &= 839513 \\ 3(a+b+c)^2c^2 &= 1587 \\ d^3 &= 1 \end{aligned}$$

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\sqrt[3]{5389983870081} = 17533$$

$$\begin{array}{r} 3a^2 = (3) \\ 3ab = 21 \\ 3ab^2 = 228 \\ b^3 = 819 \\ \hline 4469 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 552599 \\ 12846651 \\ \hline 17533 \end{array}$$

Liobee

$$\begin{array}{r} 3(a+b)^2 = (864) \\ 3(a+b)^2 \cdot c = 4335 \\ 3(a+b)^2 \cdot c^2 = 4348 \\ c^3 = 30733 \\ \hline 125 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 307106089 \\ 17533 \\ \hline 5389950958437 \\ 232911644 \\ \hline 5389983870081 \end{array}$$

Verenunt

$$\begin{array}{r} 3(a+b+c)^2 = 2306088 \\ 3(a+b+c)^2 \cdot d = 245625 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3(a+b+c)^2 \cdot d^2 = 304637 \\ d^3 = 2999120 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5389950958437 \\ 232911644 \\ \hline 5389983870081 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3(a+b+c+d)^2 = 29990930 \\ 3(a+b+c+d)^2 \cdot e = 27657081 \\ 3(a+b+c+d)^2 \cdot e^2 = 23338498 \\ e^3 = 202911644 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 202911644 \\ \hline 202911644 \end{array}$$

Irrationalzahlen
durch
Ausziehung der Cubic. Wurzeln.

Man kann sich die ersten 9 ganzen Zahlen
durch die 9ten Mächte oder Cubus.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 8. 27. 64. 125. 216. 343. 512. 729, und

zwischen einander folgenden Cubus z. B. zwischen

2 und 64 die Zahl 58 fällt und die Pragen stellt: Was

ist $\sqrt[3]{58}$? so ist klar, daß diese Cubic. Wurzel zwischen

3 und 4 liegen muß; ist sie genau eingetragener, so ist sie

einb. 3. in einem ersten Leinso.

Es finden sich also unter den ersten neun 1-729

Das 3^e soll die Cubic. Wurzel bil auf 3 Original Stellen
gefehlmenen

$$\underline{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3}$$

$$\sqrt[3]{391000000} = 3391$$

$$\begin{array}{r} 3a^2 \quad 120 \\ 3a^2b \quad (27) \\ 3ab^2 \quad 81 \\ 3ab^2 \quad 390 \\ b^3 \quad 3090 \\ \hline 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3391 \\ 30519 \\ 10173 \\ 10173 \\ \hline 11498881 \end{array}$$

3391

$$\begin{array}{r} 3(a+b)^2 \quad 30630 \\ 3(a+b)^2 \quad (3267) \\ 3(a+b)^2 \quad 29403 \\ 3(a+b)^2 \quad 2270 \\ 3(a+b)^2 \quad 8019 \\ \hline 42570 \\ 729 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11498881 \\ 103489929 \\ 34496643 \\ 34496643 \\ \hline 38992805471 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3(a+b+c)^2 \quad 417870 \\ 3(a+b+c)^2 \quad (344763) \\ 3(a+b+c)^2 \quad 344763 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38992805471 \\ 729 \quad 1529 \text{ alle drei} \\ \hline 34000000000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3(a+b+c)^2 \quad 730470 \\ 3(a+b+c)^2 \quad (1017) \end{array}$$

$$d^3 = 7294538$$

$$\underline{7294538 \text{ alle drei}}$$

Cubic. Wurzel aus gemeinen und Dezimalbrüchen zu ziehen.

Die Zahl, auf die die Regel bei Cubirung der
Cubik. Wurzel aus gemeinen Zahlen.

Man zieht, sammt den Ziffern, aus dem
Zahlen die Cubik. Wurzel, und über dem
durch Cubirung gefassten $\frac{1}{3}$ L.

$$\sqrt[3]{\frac{11}{20}} = \frac{\sqrt[3]{11}}{\sqrt[3]{20}} = \frac{2,2}{2,7}$$

$$\sqrt[3]{\frac{51}{60}} = \frac{\sqrt[3]{51}}{\sqrt[3]{60}} = \frac{3,7}{3,9}$$

$$\sqrt[3]{\frac{146}{125}} = \frac{\sqrt[3]{146}}{\sqrt[3]{125}} = \frac{5,2}{4,9}$$

Wegener sollt man sich 2 Stellen zu rechter
gefühlt machen.

Beispiel.

$$\sqrt[3]{0.345} = 0.69$$

$$\sqrt[3]{0.525} = 0.79$$

$$\sqrt[3]{0.05} = 0.14$$

$$\sqrt[3]{14.0314} = 8.99$$

Beispiel: Man soll die beiden Stellen
des Quadrats und Cubi: Wurzelgesetz machen
ist. Man soll die beiden Stellen
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
in zweifelhafte Mängel A+B auf die 10. Stelle
haben, man soll die beiden Stellen, die die

Vorher $25^{\frac{1}{2}}$ $\sqrt{25} = 5$

Von $a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{3}{2}} = a' = a$ und $\sqrt{a}$

$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{a}$ ebenfalls $= a$ ist, so muß auch $a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$ folgen.

Zur Allgemeinung ist daher $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

Allgemein ausgedrückt heißt dies $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$,

welches folgende Regeln giebt:

Wenn Größes Laufsprechennamen haben so
bedeutet das Nennen desselben drei Gänge
des rückwärtsgehenden Mäxgals und des Züßes
absolut Eigentümlich des Mäxgals Größes. —

Grundbegriffe
und
Vordersätze
von den

zijn
Progressionen.
Johann

James M. Smith
Prophet

Prophet
James M. Smith

1844

Progressionen.

§ 1.

Unter einer *Progression* versteht man eine Reihe von Zahlen, die nach einer bestimmten Regel fortgesetzt werden können. Die Zahlen, die in einer Progression vorkommen, heißen *Termini*. Die Progressionen, die in diesem Abschnitt behandelt werden, sind:

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. ...

1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. ...

30. 26. 22. 18. 14. 10. 6. 2. ...

21. 18. 15. 12. 9. 6. 3. ...

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. ...

1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. ...

1. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{32}$. $\frac{1}{64}$

Ob das Entwerfung einer Versicherung gegen
den, dass in einem bestimmten Falle der wissenschaftlichen
oder dergewöhnlichen Verhältnisse, der Zustand.

Ob, Stellung. L. In einem bestimmten Punkt
für den wissenschaftlichen Verhältnisse, die 3. Stelle
aber in der Wissenschaft im gewöhnlichen Verhältnisse
den.

Ob, was dann die Progression in wissenschaftlichen und
gewöhnlichen Verhältnissen.

Ob, dass die wissenschaftlichen Verhältnisse nicht den
Verhältnissen der folgenden 2. Stelle dann in der
Wissenschaft, bei den gewöhnlichen Verhältnissen den
selben Quotient.

Namastu die uilffunfzigste die gantze hiesige Prager
Stadt, sind uilffunfzigste, Prager, man die Prager
Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager
Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager

Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager
Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager
Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager

Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager
Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager
Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager

Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager
Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager
Prager uilffunfzigste, Prager, man die Prager

Um die Progression allgemein auszudrücken, bedient
man sich am besten der Lücke, haben. Man setze
z. B. das 1^{te} Glied einer arithmetischen Progression
A, den Unterschied zwischen Gliedern a, d, und
nimmt an, dass die Reihe eine, steigende sey, so ist die all-
gemeine Ausdruck:

$$A, A+d, A+2d, A+3d, A+4d, A+5d, \dots$$

$$\begin{array}{l} a=3 \quad 3, 3+2, 3+2.2, 3+3.2, 3+4.2, 3+5.2 \\ a=2 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \quad 9 \quad 11 \quad 13 \end{array}$$

Willen aber die Progression nicht fallend setzen, so
nimmt man folgende Reihe, von der man stellt

$$A, A-d, A-2d, A-3d, A-4d, A-5d$$

$$\begin{array}{l} a=50 \quad 50, 50-5, 50-2.5, 50-3.5, 50-4.5, 50-5.5 \\ a=5 \quad 50 \quad 45 \quad 40 \quad 35 \quad 30 \quad 25 \end{array}$$

3. L. = $\frac{1}{e}$ so minden die fallende Reihe fallend.

$$a, \frac{a}{e}, \frac{a}{e^2}, \frac{a}{e^3}, \frac{a}{e^4}, \dots, \frac{a}{e^n}$$

$$b, \frac{b}{3}, \frac{b}{3^2}, \frac{b}{3^3}, \frac{b}{3^4}, \dots, \frac{b}{3^n}$$

$$b, \frac{b}{3}, \frac{b}{9}, \frac{b}{27}, \frac{b}{81}, \dots$$

Wenn man einen Faktor von einem anderen abstrahirt
so mindert die fallende Reihe der Faktoren zu nicht weniger,
mehrer dasjenige was man hinzufügt zufließend zuil bemerkt.

Wien

Elementarlehren

von den

arithmetischen ^{2^{ten}} Progressionen

a. Arithmetische Progression.

S. A.

1. Lez j'indicate les formes presyner pour l'ind. sing. masculin
de l'infinitif;

Valerius Gladsteinmann Annus.

Wie verschiedenmal ich mich Dir ansehe!

Ein Zerst. des Glases: schreibe man mit N bezeichn. Auf:

Der letzte Glanz. mehr als ein Wund.

Die Lumen aller Praxinffindylinders, welche man mit 3
verdrückt.

Aber dann bis zur Aufzählung angibt, dass jedes Glied
 eines bestimmten Progressions, seiner Grösse nach
 bestimmt ist, sobald man das erste Glied und die
 Differenz bestimmt hat, dann jedes folgende Glied
 entsteht durch sein Glied und die gemeine
 Progression der Differenz.

Wannz. L. Substrat Glind = Summ in Differenz = 4, so kommen
nun sich in das folgende Glind durch die Summe 54 (n. 4) aus.

Lebhaft in der Disposition, heftig, heftig, heftig,
sagt sich, das ist die, die die Disposition

me 3rd

in 4th Ave

in n. *hva*

2. " 3. mannerly

Examiner,

Ne minus

verkäuf. z. L. 100 fl. = 5

Wissenz = 4, so mind in dem 21. Gl. in
 diese Differenz 20 mal zu kommen, und diese Gl. müßte =
 = 54 (21 - 1). 4. folgen. Also 54 (20. 4) = 54 88 = 85.

Nützlicher als in d. Glind = 16. So fort mehr in jedem
für das letzte in Glind.

$$\underline{\underline{U = a + (n - 1) \times d..}}$$

Verdauung

Die zwanzigste und das hundertste Glied in einer Reihe,
 wobei das zwanzigste Glied = 3 die Differenz = 4 man
 100^{tes} Glied = $3(100-1) \times 4 = 399$

Vollkommenes Journal: Ue. A. (n-1) & d. der Maß
der Differenz von die Größen man d. Linderform
man bestimme die Größen d. Linderform u. d.
= A. (n-1) & d. m. d. der Gleichheit d. Linderform
man auf Gleichheit d. Linderform.

Wird nunmehr bey der Feil mit $n = 1$ dividirt, so erhält man, der Gleiche durch Gleiche dividirt, gleich Quotienten gibt:

$\frac{a - U - a}{n - 1}$ *malysal salgen Dab.*
 Gammis Regel Gibb.

Man findet die Differenz zweier unrichtigen

manier Das letzte Glied = 30

Subingda = 2

und in 3 auf der Glinder = 8 ist somit nach obigen $a = \frac{3a}{8-1} =$
 $= \frac{28}{7} = 4.$

Überhaupt mit dem manigen Formel $U = a + (n-1) \times d$ In
 Man kann n zu finden. Zuseh In Gleichung. $U = a + (n-1) \times d$
 zu a auf beiden Seiten mit d Formel $U = a + (n-1) \times d$

Mindamus das Laus d' begit sich für ein ymnoson, so n^a,
follman $\frac{d}{d} - \frac{g}{d} = n - i$ oder $\frac{d}{d} - \frac{a}{d} = n - i$ mindam begit,
sich + i od d' ind, so ist

$$v = \frac{U - a}{1}$$

Lesen Sie Regel.

Man muss nun zeigen, dass die beiden
Arten, die Differenz durch das Verhalten der
ganzen Individuen zu den verschiedenen
Individuen, dass man die beiden Arten
in der That, dass man die beiden Arten

Wie groß ist die Fläche eines Parallelogramms, wenn
die h_h Fläche = 21

Rechnen " = 3

Die Differenz = 3 in d. 2

$$n = \frac{21-3}{3} + 1 = \frac{18}{3} + 1 = 7$$

Der Karyographi besteht aus 4 Grundformen
in folgenden: 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21.

Prof. Hermannus de Bekhovenen, Dordrecht

$U = a + (n-1) \times d$ Sum Maats van de reekten, men verdubbel
bij de laatste $(n-1) \times d$ byzegen, so veel geeft $U(n-1) \times d = a$

oder $a = n - (n-1) \times d$ Wird die Querschrift:

Wenn man die Differenz mit dem 1. Term der Reihe
multipliziert und dieses Produkt man zum letzten
Terme subtrahiert, so erhält man das n-te Glied. z. B. wie
groß ist das 13. Glied einer Progression mit 1. Term 13
13 Die Differenz = 2 die Zahl der Glieder = 1 ist.

$$a = 13 - (4-1) \times 2$$

$$= 13 - 6 \times 2$$

$$= 13 - 12$$

$$= 1$$

$$a = 1.$$

Wohl

Zusammenstellung der Formeln

§ 1.

Formel, um das letzte Glied zu finden $U = a + (n-1) \times d$
 if $U =$ letztes Glied

$a =$ erstes Glied

$d =$ Differenz

$n =$ Zahl der Glieder

Formel um die Differenz zu finden $d = \frac{U - a}{n - 1}$

Formel um die Gliederzahl zu finden $n = \frac{U - a}{d} + 1$

Formel um das erste Glied zu finden $a = U - (n - 1) \times d$

§ 2.

Wenn man eine arithmetische Progression in der
 Aufeinanderfolge ihrer Glieder betrachtet, so zeigt
 sich, dass jedes Glied das vorhergehende um dieselbe
 folgenden Glied um eine Differenz mehr oder weniger

Wenn die Zahl der Pragerffinghinder nicht ungerade ist
 so muß die Summe aus dem letzten Glied der Pragerffing
 erhalten mit Mannszahl sein.

Wenn aber die Gliederzahl ungerade ist und durch
 alle Gliedergruppen nicht aufkommt, so gibt es fallweise
 Prager, alle minimalen Glieder sind. Wenn die Zahl der
 in der letzten Gruppe die Zahl aller Glieder, so fällt auch
 die Prager, dann ist $C = A + U$ ist.

Wenn man die Summe aller Glieder der Pragerffing

$$S = \frac{(A+U) \times 22}{2}$$

Man erhält die Gliederzahl der Pragerffing, so
 erhalten man die Pragerffing in selben Prager, dann ist C

$- A + U$ ist die Summe aller Glieder der Pragerffing

$$S = \frac{(A+U+n-1)}{2}$$

Wenn das erste Glied $S = \frac{(a+U)}{2}$ ist, so muß die

$$\text{Summe aller Glieder} = (a+U) \times \frac{(n-1)}{2} + \frac{(a+U)}{2} =$$

$$= (a+U) \times \frac{n}{2} - \frac{a+U}{2} + \frac{a+U}{2}$$

$$S = (a+U) \times \frac{n}{2} \text{ finis.}$$

Wenn man die Summe aller Glieder in je einer
fall gefunden, man kann das System leicht
addieren und die Summe mit der selben Gliederzahl
multipliziert. z. B. (s. oben die Reihe 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23)

$$\text{so ist } S = (3+23) \times \frac{11}{2} = 143$$

Das ist aber gefundenen Summe laßt sich auch 3 mal
für die Mathematik A. Und n. ablesen.

Wenn man in dieser Summe $S = (a+U) \times \frac{n}{2}$ auf
beide Seiten mit $\frac{n}{2}$ dividirt wird, so erhält man $\frac{S}{n} =$
 $= \frac{a+U}{2}$ und man wird das Mittel abgelesen.

$$A = \frac{2 \cdot S - W}{n} \quad S. f.$$

man kann die Dagegen Künenollen Glinde Dagegen
 Glindezeit die Dagegen Dagegen Dagegen
 Glindezeit, Dagegen Dagegen Glindezeit
 Dagegen. L. die Dagegen Dagegen:

$$S = 116$$

$$\text{Dagegen Glinde} = 25$$

$$\text{die Glindezeit} = \text{Dagegen Dagegen Dagegen Glindezeit?}$$

$$A = \frac{2 \times 116}{8} - 25 = 1$$

Voll man die Dagegen Dagegen Dagegen
 man die Dagegen Dagegen Dagegen $\frac{2 \cdot S}{n}$
 A + Dagegen Dagegen Dagegen A
 Dagegen Dagegen Dagegen

$$\underline{U = \frac{2S - a}{n} \text{ mind. Summe der Quadrate}}$$

Man findet das letzte Glied eines arithmetischen
 Progressions, wenn die Summe aller Glieder und
 die Anzahl der Glieder n und den Quotienten der
 ersten Glieder gegeben sind, z. B.
 Beispiel: das letzte Glied, wenn $S = 116$

$$\text{das erste Glied} = 4$$

$$\text{die Anzahl der Glieder} = 8 \text{ ist}$$

$$U = \frac{2 \cdot 116 - 4}{8} = 29$$

Fall der Mannschaften bestimmt man, so findet man
 in der Formel: $S = (a + U) \cdot \frac{n}{2}$ und die Zahl
 mit $a + U$ so mind. $S = \frac{n}{2}$ und man kann
 sich mit n multipliziert so ist

$$\underline{n = \frac{2S}{a+u} \text{ Dage die Anzahl.}}$$

Man kann die doppelte Reihenfolge auch fraglich
gliedern durch die Reihenfolge der letzten Glieder
dividirt, so ist die Quotient die Zahl der Glieder.

z. B. $S = 148$
 $a = 1$

$u = 36$ Ringgröße ist $n = \frac{2 \times 148}{1+36} = \frac{296}{37} = 8$

Ringgröße ist in dieser Progression die Differenz, und
minimale ist die Ringgröße selbst.

Die Differenz $d = \frac{u-a}{n-1} = \frac{36-1}{8-1} = \frac{35}{7} = 5$

Reihe: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36.

I

Reihe

Anwendung dieser Formel.

53.

Die allgemeine Regel ist:

Wenn man eine gewisse Menge in einem gewissen
 Anfang und Ende hat, bis zu einem bestimmten Ende
 zu finden, so ist das Quadrat der ersten Zahl selbst und
 halbiert die Summe, so ist die Hälfte der mittleren Glieder summe.

Es ist z. B. die Summe der ersten 30 natürlichen Zahlen $\frac{30^2 + 30}{2} =$
 $\frac{900 + 30}{2} = \frac{930}{2} = 465.$

Die Summe aller natürlichen Zahlen von 1
 anfangend bis zu einem bestimmten Ende
 ist das Quadrat der ersten Zahl selbst. Es ist die
 Summe der ersten 20 natürlichen Zahlen $= 20 \times 20 = 20^2 = 400.$

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39$
 $= 400.$

I Aufgabe: Wenn eine Leinwand 30 Ellen breit ist und man
 zuerst für die 1^{te} Ellenzugrabene 20 Sch. für je die halbe Leinwand
 10 Sch. mehr, so ist die Frage, wieviel die letzten Ellen und wie
 viel die ganze Leinwand zu graben kostet.

$$U = a + (n-1) \times d \text{ hier ist } a = 20$$

$$d = 10$$

$$n = 30 \text{ das ist}$$

$$U = 20 + (30-1) \times 10 = 20 + 29 \times 10 = 290 + 20 = 310 \text{ Sch. kostet die}$$

letzte Ellenzugrabene.

Nachdem die erste und letzte Leinwand bekannt ist, so wird:

$$S = (a + U) \times \frac{n}{2}, \text{ so wird } S = (20 + 310) \times \frac{30}{2} = 310 + 20 = 330 \times \frac{30}{2} =$$

$$330 \times 15 = 4950 \text{ Sch. = 82 } \frac{1}{2} \text{ Rthl. mehr für die Leinwand}$$

zu graben kostet.

II. Wenn auf einer dreieckigen Leinwand die erste Leinwand
 10 Sch. u. s. m. ist

befinden und man selbst diesen Zustand 30 sind, ist die Lage:
 Die viele Zingaleuffelt die unter den Kaiserlichen und vielen
 befinden sich in der Jugend.

$$a = 4 \quad n = 30 \quad U = a + (n-1) \times d = 4 + (30-1) \times 3 = 29 \times 3 + 4 = 91$$

$n = 30$

A. 3.

$d = 3 \quad T = (a+U) \times \frac{m}{2} = (4+91) \times \frac{30}{2} = 95 \times 15 = 1425, \text{ Safra}$

Sub Lieutenant on Board of the Brigantine Fort Young on Decr 14 25 1798.

II.) Eine Meile von der Gränze des Lagers nach Norden zu sein
und zu verstehen, daß das Lager in 1/4 Meilen nach Norden
von der Gränze des Lagers in 1/2 Meilen nach
Norden zu sein. Es ist aber zu verstehen, daß man sich in der
Lagerstätte und in der Meile in der Lagerstätte
Lagerstätte befinden muß. —

$n = 19$


$$a = U - (n-1) \times d.$$

$$d = \frac{1}{4}$$

$$U = 14\frac{1}{2}$$

$$14\frac{1}{2} - (19-1) \times \frac{1}{4} = \frac{58}{4} - \frac{18}{4} = \frac{40}{4} = 10 \text{ near Lima (No. 10) } \frac{1}{4}$$

$$S = (a+u) \times \frac{n}{2} = (10 + 14\frac{1}{2}) \times \frac{19}{2} = \frac{49}{2} \times \frac{19}{2} = \frac{931}{4} = 232\frac{3}{4} \text{ M.}$$
 In 1000 Tagen 10 Meilen und 100000 Meilen aben
 232 $\frac{3}{4}$ Meilen betrag.



Elementar. Lehren

von dera

geometrischen Progressionen.

Ernst Fleischer

B. Geometrische Progressionen.

Bei jeder geometrischen Progression können wir bei der
arithmetischen Summe in Betracht.

1. Das erste Glied a

2. Den Gemeinheitsfaktor

3. Das letzte Glied a_n

4. Die Zahl der Glieder n

5. Die Summe aller Progressionsglieder S

Über den Begriff und die Eigenschaften einer geometrischen
Progression wird gesagt, dass ein Glied derselben eine
bestimmte Zahl a habe, sobald das erste Glied und der
Gemeinheitsfaktor bekannt sind. Wenn da ein solches Glied
überhaupt nicht angegeben wird, so ist es selbst, dass
es bestimmt durch Gemeinheitsfaktor multipliziert wird, so ist

jedes Glied ist ein Produkt aus dem vorherigen Glied in einer Potenz
des Exponenten aus $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$. Das 1^{te} Glied a

Exponent = e . B. J.

zeigt sich abigebenen mit halber oder der Exponenten:

$a, a.e, a.e^2, a.e^3, a.e^4, a.e^5, a.e^6$, ruft man, das das 3^{te}
Glied, das Exponenten aus der 2^{ten} Potenz, das 4^{te} das
Exponenten aus der 3^{ten} Potenz u. s. w. nach, und das
also das n ^{te} Glied die Exponenten aus der Potenz $n-1$ ^{te}
Potenz wird. Ruft man das n ^{te} Glied a , so ist a das
richtige Glied: $= a.e^{n-1}$. also

$a = a.e^{n-1}$. Dies gibt die allgemeine Regel:

Man findet die Größeren und kleineren Glieder in
geometrischen Progression, wenn man das Glied mit seiner
Potenz des Exponenten multipliziert und dann Grad der
Glieder zusammen $\frac{1}{2}$ gleich ist.

Beispiel.

$a=1$ daher $u = 4 \times 2^7 = 4 \times 128 = 512$ und die Progression
 $c=2$ $n=8$ stellt sich 1, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.

In der Formel: $u = a \times c^{n-1}$ kann man auf zwei Arten a
 und j aus n und c bestimmen. Wenn man a sucht
 auf beiden Seiten mit c^{n-1} dividirt so wird

$$a = \frac{u}{c^{n-1}}, \text{ man liest die Regel ab!}$$

Wenn findet das n te Glied einer geometrischen
 Progression, man das letzte Glied durch die Potenz der
 Geometrie dividirt und den Quotienten das Glied a -1
 gleich ist.

Aufgabe. Wie groß ist das n te Glied einer geometrischen
 Progression, in welcher $a = 6561$
 $c = 3$
 $n = 9$ ist.

$$a = \frac{6561}{3} = \frac{6561}{6561} = 1.$$

Aus der Formel $a = a x e^{n-1}$ der Masse zu finden,
 dividirt man beiderseits mit a , wodurch $\frac{a}{a} = e^{n-1}$ wird. Zieht
 man nun aus beider Seiten die Wurzelmann Grade $n-1$ aus,
 so wird $\sqrt[n-1]{\frac{a}{a}} = e$ das Resultat

$e = \sqrt[n-1]{\frac{a}{a}}$. Monom'selgendes Regelformel:

Wenn man das ~~erste~~ Glied einer ~~Progression~~ dividirt,
 und aus dem Quotienten einen Wurzelzieht, dann Grad
 der Gliederzahl ummischet gleich ist, so erhält man das Geometrische
 der Progression.

Aus in einem geometrischen Progression die ersten alle Glieder
 zu finden markieren folgende:

Wenn man das erste Glied einer geometrischen Progression
 multipliziert mit dem Glied subtrahiert in demselben Differenz
 durch den einen Quotient man den Geometrischen findet,

Von dem nachstehenden Quotienten die Dimensionen der gegebenen
 Progression zu stellen, so ist die obige Lastschiffbindung bewiesen,
 Welches Prinzipium Allgemeinung enthält die Summe gibt:

$$\underline{\underline{S = \frac{ax^n - a}{e - 1}} \quad \text{Aus dieser Summe kann man} }$$

Summe der Progression auszurechnen

$$\underline{\underline{a = \frac{S(e - 1)}{e^n - 1} \quad \text{f.} }}$$

wenn die Dimension

aller Progressionsglieder mit demselben gemeinsten Faktor
 multipliziert und diese Producte durch ihren Rest der Progression
 den Grad der Gliederzahl ist und man dann die Summe
 der Progression hat, dividirt man, so gibt das Quotient die obige
 Progressionsglieder zu dem a aus
 Die Summe der Progression zu finden:

$$\underline{\underline{e = \frac{S - a}{S - u} \quad \text{da Progression} }}$$

Es wurde ferner das Quadrat, welches die Diagonalen des
 geraden Zylinders darstellt, in die beiden Quadrate dieses
 Kreises auf das letzte Glied abgezogen und mit dem letzten
 Glied in der Reihe dividirt.

Aufgabe. Ein Zylinder hat seinen Radius 2
 und sein Volumen 4374. Wie hoch ist er?
 und wie hoch ist die Fläche des Kreises, auf dem er
 steht? Die Höhe des Zylinders ist die gleiche wie die
 des Kreises. Die Fläche des Kreises ist die gleiche wie die
 des Zylinders. Die Fläche des Kreises ist die gleiche wie die
 des Zylinders. Die Fläche des Kreises ist die gleiche wie die
 des Zylinders.

$$u = a \times c^{n-1} = 2 \times 3^{8-1} = 2 \times 2187 = 4374 \text{ ist die Höhe des Zylinders}$$

$$\text{so ist die Fläche des Kreises } 4374 \text{ Quadrat, die Fläche des}$$

$$\text{geraden Zylinders ist } S = \frac{a \times c^n - a}{c-1} = \frac{2 \times 3^8 - 2}{3-1} = \frac{2 \times 6561 - 2}{3-1} =$$

$$\frac{13120}{2} = 6560 \text{ ist die Fläche des geraden Zylinders}$$

$$\begin{aligned} n &= 8 \\ a &= 2 \\ c &= 3 \end{aligned}$$

II. Viel lieber das junge Gemüthe nicht geistlich zu erziehen
als es zu einem weltlichen Stande zu ziehen. Das ist die
sicherste und beste Art zu erziehen.

$$S = \frac{a \times e^n - a}{e - 1} = \frac{2 \times 2^{10} - 2}{2 - 1} = \frac{2048 - 2}{2 - 1} = \frac{2046}{1} = 2046 \text{ f.}$$

von der Pflanzung der Gärten. —

[illegible]

$a_1 = a \times e^{n-1} = 1 \times 2^{31} = 1 \times 4294967296 = 4294967296.$

$\ell = 2$
 $n = 32$

$$S = \frac{ax^e - a}{n} = \frac{1 \times 2^{31} - 1}{2-1} = 4294967296 - 1 = 4294967295$$

14895097343d. k. s. n. l. Das Jahr d. brj 32 zu hundert.

A close-up photograph of a heavily stained and discolored strip of aged paper or parchment. The surface is covered in numerous dark brown and black spots, likely foxing or mold, and larger areas of discoloration. The texture appears rough and uneven.

VODERSAETZE

und

GRUNDBEGRIFFE

von den

LOGARITHMEN.

1000 217 217

1000

1000 217 217

1000

1000 217 217

Von den Logarithmen.

S. j.

2. Ein Logarithmus mit Tafel und inwendigen Vergleichung in
Gleichungen v. d. Proportion mit einem inwendigen Tafel.
Für diese Verbindung steht in der Tafel, wie es gezeigt wird, in
einmalige Intervalle in der Tafel in einem und demselben
Logarithmus Tafel, das ist Tafel = 1 ist in einem Logarithmus
inwendigen Tafel in einem und demselben Logarithmus
inwendigen Tafel, das ist Tafel = 1 ist.

Gezinnu bejden Waisen, Helgen u. d.

$a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, a+6d, \dots$

$a, ae, ae^2, ae^3, ae^4, ae^5, ae^6, \dots$ form a series, increasing

no. 10 In dem ersten Theile des ersten Glindes befindet sich ein
zweites Glind. Das zweite Theil des ersten Glindes befindet sich

2 Krugaffine. nach Pagan. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

" 1. ℓ^1 ℓ^2 ℓ^3 ℓ^4 ℓ^5 ℓ^6 naturifera

sonstige nach oben aufsteigend.

B. Aus der Betrachtung dieser Reihen ergibt sich, dass die in der ersten Reihe befindlichen Glieder der folgenden Reihe entsprechen, und dass die in der zweiten Reihe befindlichen Glieder der dritten Reihe entsprechen. Es ist also die Folge der Glieder der Reihe die Folge der Glieder der Reihe.

Man kann diese Reihe auch so schreiben:

$1d, 1d, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d, \dots$

$e^0, e^1, e^2, e^3, e^4, e^5, e^6, \dots$ so ergibt sich, dass die in der

ersten Reihe befindlichen Glieder der zweiten Reihe entsprechen, und dass die in der zweiten Reihe befindlichen Glieder der dritten Reihe entsprechen. Es ist also die Folge der Glieder der Reihe die Folge der Glieder der Reihe.

J. Man kann auch die Reihe so schreiben:

$-d, -2d, -3d, -4d, -5d, -6d, -7d, \dots$

$\frac{1}{e}, \frac{1}{e^2}, \frac{1}{e^3}, \frac{1}{e^4}, \frac{1}{e^5}, \frac{1}{e^6}, \frac{1}{e^7}, \dots$ man sieht, dass die

zusammengesetzte Reihe aufsteigend gebildet werden kann:

$$e^{-1}, e^{-2}, e^{-3}, e^{-4}, e^{-5}, e^{-6}, \dots$$

Hieraus kann man jede Glieder der arithmetischen Reihe die Größe der
Fortschritt für die geometrische Reihe folgend: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 für die
in geometrische folgend: 0, - 1, - 2, - 3, - 4, - 5, - 6, - 7, welche die Reihenfolge der
natürlichen Zahlen und zugleich auf die in der Reihe der
der Glieder der arithmetischen Progression darstellt.

B). Wenn die Zusammensetzung beider Reihen nach der folgenden Verbindung:

$$- 5 - 4 - 3 - 2 - 1, 0, + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$$

$$e^{-5}, e^{-4}, e^{-3}, e^{-2}, e^{-1}, e^0, e^1, e^2, e^3, e^4, e^5, \text{ man erhält dann die Reihe der Aufsteigenden}$$

zähl der arithmetischen Reihe und der Aufsteigenden der geometrischen

Progression betrachtet werden kann. Auf diese Weise, daß die Zusammensetzung
der Glieder in der arithmetischen Reihe in der arithmetischen Progression
bildet.

E. Das Verhältniß $e^0 : e^1$ ist. Das Verhältniß nun zu e : besteht
 aus demselben Glied der Progression, so wie zu dem ersten
 Glied, man nennt dieses Verhältniß das

Grundverhältniß.

Der oben erwähnte Hülfsatz ist = 1 ist, so lautet der Satz
 Dieses Grundverhältniß ist eigentlich das Größere zu dem Kleineren. Es
 wird daher die Grundzahl genannt und es ist klar, daß es keine

bestimmte Grundzahl auf sich nimmt, sondern es kann jede beliebige
 Progression gegeben. z. B. man $e = 10$ so wäre $e^0 : e^1 = 1 : 10$ und

Die Progression ist folgende: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 oder
 $10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4$ p. f. f.

3. Da e zu e^1 ein Verhältniß und das Verhältniß nun zu e^2
 gleich ist, so liegen zwischen e^0 zu e^2 ein solches Grundverhältniß,
 das man $e^0 : e^1 = e^1 : e^2 = e^2 : e^3$, so liegen zwischen $e^0 : e^3$ wieder 3 solche
 Grundverhältnisse, und es ist klar, daß zwischen $e^0 : e^{n-1}$ in dieser
 Grundverhältnisse liegen, denn ja das = 1: e ist.

[illegible]

3. Da die Grundzahl millküslich genommen werden kann, so
 sind unendlich viele verschiedene Potenzen der Basis in möglichem
 Gliedern man muss finden die Größte unter denselben Logarithmen
 suchen, man die Grundzahl 2. 3 oder 10. man, so auch finden
 folgenden Potenzen, zu demselben die 4^{te} Potenz als Logarithmen.

Potenzgesetz

| | | | | | | |
|----|-----|------|-------|--------|---------|----------|
| 1. | 2. | 4. | 8. | 16. | 32. | 64 |
| 1. | 3. | 9. | 27. | 81. | 243. | 729 |
| 1. | 10. | 100. | 1000. | 10000. | 100000. | 1000000. |

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Logarithmen

Der Logarithmus der Zahl 16 ist 1.2041
 10000 ist man 1. 16 man 2. 81 man 1. 10000 ist Grundman 4.

Logarithmus, das heißt 1:2 oder 1:3 oder 1:10.

8. Soll diese Tabelle nicht, sondern die Logarithmen
 man findet die Zahlen und die Potenzen, so man für
 alle man kann es als Grundzahl genommen werden.

Lehrsatzungenformeln, so in den Logarithmen enthalten sind
Logarithmenformeln.

§ 3.

Als nun das Logarithmenrechnen sich allgemein
in der Mathematik mehr und mehr eingebürgert hat,
so ist:

1. Man findet das Logarithmus eines Produktes, wenn
man die Logarithmen der Faktoren dieses Produktes
zusammenaddirt, oder L. ab das Produkt so man den Logarithmus
 $ab = \text{Log. } a. + \text{Log. } b$ findet.

2. Das Logarithmus eines Quotienten man findet,
wenn man den Log. des Dividenden vom Log. des Divisors
subtrahirt oder $\text{Log. } \frac{a}{b} = \text{Log. } a - \text{Log. } b$.

3. Der Logarithmus einer Potenz ist der Logarithmus der Basis
Log. des Potenzenmal so viel als der Log. der Basis.

3. Man findet den Log. einer Potenz, wenn man den Log. ihrer
Wurzel mit dem Grad dieser Potenz multipliziert. Der Log. $a^3 = 3 \times \text{Log } a$.

4). Man findet den Log. einer WurzelgröÙe, wenn man den Log. jener
GröÙe, woraus die Wurzel gezogen worden soll durch den Grad der
Wurzel dividirt. z. L. die nte Wurzel aus a ist $\sqrt[n]{a}$ d. h. Log. $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{n} \times \text{Log } a$.

Will man das Produkt einer gegebenen GröÙe die Wurzel einer andern
GradgröÙe, so muß den Log. dieser GröÙe durch den Grad dieser
Wurzel dividirt, und die so erhaltene Logarithmus die
gesuchte GröÙe gesucht werden, welche die verlangte
Wurzel ist.

Handwritten signature or flourish.

Erklärung
des

Logarithmen System und der logarithmischen

Tafeln.

S. J.

Das Logarithmen System von Briggs.

Das kann bis jetzt noch nicht, das künftige nicht, Logarithmen
 Systeme geben kann, die nicht die Logarithmen sind, was
 immer dieselben, sie hängt mit der Wissenschaft der
 Natur und der menschlichen Verfassung zusammen und kann
 nicht sein, wie in der menschlichen Sprache und der Kunst.
 Der Zusammenhang, zwischen der Wissenschaft der
 Natur und der menschlichen Verfassung, ist die Grundlage
 der menschlichen Wissenschaft, die in der Natur und
 der menschlichen Verfassung liegt.

Henry Briggs beschrieb die neuen Logarithmen Tafeln und
gab sie in London heraus und, starb in Japan 1630 zu Oxford.
Johst Burgius in Holland und Nepper in Holland waren die
neuen Mathematiker, welche die neuen Tafeln herausgaben.

Kauf die neuen Logarithmen Tafeln, so wie es das

$$\text{Log. } 1 = 0$$

$$\text{Log. } 10 = 1$$

$$\text{Log. } 100 = 2$$

$$\text{Log. } 1000 = 3$$

$$\text{Log. } 10000 = 4$$

$$\text{Log. } 100000 = 5 \text{ aber auch Log. } 0,1 = -1$$

$$\text{Log. } 0,01 = -2$$

$$\text{Log. } 0,001 = -3$$

$$\text{Log. } 0,0001 = -4$$

$$\text{Log. } 0,00001 = -5$$

$$\text{Log. } 0,000001 = -6 \text{ So man sieht die Log}$$

aller Zahlen, welche zwischen 1 und 100 p.p. und zwischen 1 und 0,00001 liegen,
 zu können bringen, so auch, daß die für die gewöhnliche Logarithmen
 Berechnung faßbar ist. Frage: Wie kann man die Logarithmen
 von allen diesen Zahlen zu finden, um sie auf die Log.
 Tafeln zu bilden.

57

1.) Zwischen 1 und 10 liegt, so wie das Log. q . größtenteils Nullen.
 kleiner als 1, so wie das mit anderen Worten, man zwischen
 1:10 ein ganzes Grundverhältnis liegt, so wie das Verhältnis
 von 1: q ein ein Teil dieses Grundverhältnisses ist, so wie das
 Frage: Was ist das Log. q ? heißt einmal, voll macht ein Teil
 des Grundverhältnisses 1:10 ist das Verhältnis 1: q und auf
 welche Weise man 10 ist das ganze q und die Frage, wie oft
 und das ist das Log. q .

2. Wenn man 1: $e = e: 10$ so heißt das Verhältnis von 1: e ein halbes
 das Verhältnis 1:10, man kann auch sagen, das man für

unter die Hälfte des Proportionsverhältnisses ein halbes von 100, das
 genommen die Hälfte des genommenen das halbe, sondern das
 genommen die Quadrat-Wurzel aus dem genommenen genommenen heißt
 Dann ist $e = \sqrt{10} = 3,1622444$ wird, so ist das Proportionsverhältnis
 1:3,1622444 demselben Proportionsverhältnis: 10 gleich und der Logarithmus
 von 3,1622444 ist $\frac{1}{2} = 0,5$

3.) Wenn die Grösse 3,1622444 und 10 fällt, so setzen wir die Proportion
 $3,1622444 : d = d : 10$ so wird $d = \sqrt{3,1622444 \times 10} = \sqrt{31,622444} =$
 $5,6234132$. Dann $\log 3,1622444 = \frac{1}{2}$ und $\log 10 = 1$ ist, so wird
 $\log 5,6234132 = \frac{1}{2} (\frac{1}{2} + 1) = \frac{3}{4} = 0,75$ d. h. nach 5,6234132 liegt $\frac{3}{4}$ des
 Grundverhältnisses ab von 1:10 und jenes Verhältnisses ist $\frac{3}{4}$ von
 Eins aus.

Es folgt aus diesem, daß $10^{\frac{3}{4}} = 5,6234132$ ist. Daß aber $10^{\frac{3}{4}} =$
 $\sqrt[4]{10^3}$ ist, wird oben bereits oben angegeben.

4. Wenn liegt die geometrische Folge zwischen 5,6234132 und 10, so
 setzen wir 5,6234132: $e = e : 10$, so wird $e = \sqrt{56,234132} =$

$$= \sqrt[3]{1.4989421} \text{ und } \log. \sqrt[3]{1.4989421} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} + 1 \right) = \frac{1}{3} = 0.333.$$

5. Weil nun die Zahl 10 und $\sqrt[3]{1.4989421}$ fällt so ist:

$$10 : f = f : \sqrt[3]{1.4989421}. f = \sqrt[3]{14.989421} \text{ oder } 2.46432.$$

$$\text{Daher ist } \log. \text{ von } 2.46432 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{15}{16} = 0.9375.$$

Die Zahl 2.46432 müßte für die ungenaue Zahl 2.46432
 gemacht werden, weil das Ansehen davon bei der Wahl zu sein
 trüßlich ist, somit, daß diese Proportionen nicht angesetzt
 werden.

Auf diese sind veränderte Proportionen die besten
 Proportionen, sozusagen, sozusagen, sozusagen, sozusagen,
 diese genauen Proportionen, sozusagen, sozusagen, sozusagen,
 ist

S. 3.

Auf diese sind die besten Proportionen die besten
 Proportionen, sozusagen, sozusagen, sozusagen, sozusagen,



Prinzipien der in angesehener Logarithmen bestimmt, dass
z. B. 8940 diese Zahl, so fällt sich mischen die Logarithmen 1000 und
10000 und das ist die Prinzipienfabrik. Hiermit geht
folgendes allgemeine Regel & Fragen:

a. Wenn ein Log. gegeben ist, so besteht die in angesehener
ganze Zahl aus einer Ziffer mehr als ein Vielfaches einer
Prinzipienfabrik.

b. Wenn man zu einer gegebenen ganzen Zahl den Log.
finden soll, so sucht man Prinzipienfabrik mehr Vielfaches
weniger, als ein Vielfaches einer Ziffer zum Log. besteht.

Bestimmung der den gegebenen Zahlen
zugehörigen Logarithmen.

1. Will man zu einer Zahl den Log. finden, so sucht man diese Zahl in der Tabelle auf.

Bruchst. 1. - 2. - 3. - 4. p.p. jenerseits der Bruchst.
 Laufst. 1. - 2. - 3. - 4. p.p. jenerseits der Bruchst. Laufst.
 Laufst. 1. - 2. - 3. - 4. p.p. jenerseits der Bruchst. Laufst.
 Laufst. 1. - 2. - 3. - 4. p.p. jenerseits der Bruchst. Laufst.
 Laufst. 1. - 2. - 3. - 4. p.p. jenerseits der Bruchst. Laufst.
 Laufst. 1. - 2. - 3. - 4. p.p. jenerseits der Bruchst. Laufst.

83

Die Logarithmen jedes gemeinen Bruches, wo Zähler
 und Nenner Ziffern enthalten, zu finden.

Man nimmt zu einem gemeinen Bruch den Log. und
 soll, so ist das Alter der Bruchst. zu finden, ob das selbe in einem
 oder in mehreren Bruchst.

Von Log. mit einem Bruchst. Laufst. findet man, wenn das
 Log. mit dem Nenner des Log. Laufst. Zähler abgezogen wird.
 Log. 5167 - Log. 67 = Log. 67 und das selbe ist
 Laufst. Log. 5167 = 3.7132385
 Laufst. Log. 67 = 1.8260748
 Log. 5167 / 67 = 1.8871637.

Kunstmanns Logarithmus 625, so ist Derselbe = 2,7958800
 man hat Log. 625 = 2,7958800 - 1

Aufgabe. Was ist Log $\frac{17}{29} = \frac{170}{290}$ Log 170 = 2,2304489
 Log 29 = 1,4629980
 Daraus Log $\frac{170}{290} = 0,7680509$ und
 Log $\frac{17}{29} = 0,7680509 - 1$

II. Was ist Log $\frac{1}{5432} = \text{Log. } 10000 = 4,0000000$
 Log. 5432 = 3,7349598
 Daraus Log $\frac{1}{5432} = 0,2650402 - 4$

Da man in den gemeinen Logarithmen nur die
 Logarithmen der natürlichen Zahlen, so lassen sich die Log. der
 gemeinen Brüche nicht finden, doch ist es leicht die
 Logarithmen der natürlichen Zahlen, zu denen man weiß
 die Log. sind.

Und die Logarithmen der natürlichen Zahlen sind auch
 man die selben in den gemeinen Logarithmen, man ist in der Lage

und fiese Dreissigszigszigszigszigszigszig Log. 3. L. Log. $9\frac{5}{8}$ - Log. $11\frac{1}{8}$ =

$$\text{Log } 11 = 1,8864907$$

$$\text{Log } 8 = 0,9030900$$

$$\text{Log } 11\frac{1}{8} = 0,9834807$$

S. 4.

Von Logarithmus jeder ganzen oder gebrochenen
Zahl von 5 - 7 Ziffern zu finden:

1. Umwandlung der Log. Tafeln in Log. aller 5. und 7. Zifferigen
Zahlen zu finden kann man folgender Hilfssatz: Wenn
man von unmittelbar aufeinander folgenden 5 zifferigen
ganzen Zahlen die Log. findet und die Log. der kleinsten zum
Log. der mittelsten und den Log. der größten auf abwärts
so bilden diese Logarithmen eine Progression in dem Verhältniß 3, weil die
den Verhältniß 1: 2 und man ganz genau aus der ersten und letzten
die Möglichkeit dieses Verhältnisses durch die Log. Tafeln nachzuweisen
kann. Es ist 3. L. Log. 1634 = 3,8824522
Log. 1633 = 3,8826953
Log. 1632 = 3,8826384 Tafel die

Lagrange'sche Differenz $\text{Zw } 2^{\text{te}} \text{ und } 3^{\text{te}} \text{ Ziffer} = 0,000569$

" " " $1^{\text{te}} \text{ und } 3^{\text{te}} \text{ Ziffer} = 0,000138$

Und ist klar das Verhältnis $1:2 = 0,000569:0,000138$.

2. Meinung. L. Zw Log. 16928 gefunden worden soll, so Division
innerhalb Ziffer 10 machend $\text{fin} = 1692,8$ und mit Ziffer

größter als 1692 und kleiner als 1693 ist, das man dann
Log. $\& 1692,8$ größer als Log. 1692 und kleiner als Log.

1693 finde. Hierin haben Log. 1693 = 3,8860954

Log 1692,8 soll gefunden

Log. 1692 = 3,8860393.

Man möge nachgefragt werden ob es nicht ausfallen soll die
Differenzen dieser Ziffer mit die Differenzen der
inner zugehörigen Logarithmen daß sich selbst man

$1:0,8 = 3,8860954 - 3,8860393 : x$.

$1:0,8 = 0,000569 : x$

$x = 0,000569 \times 0,8 = 0,0004552$.

Und in diesen Lagrange'schen Differenzen zum Log. 1692,8

und die, in dem Log. 1692 = 3,8860293

die Log. Differenz = 0,0000451

folgt Log. 1692,8 = 3,8860844 und folglich

Log 16928 = 4,8860844.

Zur Auflösung von dergl. Aufgaben dienen folgende Regeln:

1. Wenn die Zahl dessen Log. man sucht auf 3, oder 2 Ziffern besteht, so befindet man sich das Aussehen des Lückens so viele Ziffern ab, daß sich das Lücken immer noch Ziffern befindet.
2. Wenn die Zahl mehr als 3 Ziffern hat, so wird das Lücken auf die 3. Ziffer Log. nach dem Log. das man sucht, und dann die 3. Ziffer Differenz und die Stellen der 3. Ziffer Lücken auf dem Log. gefunden.
3. Wenn man die 3. Ziffer Differenz mit dem, was oben angegeben: abgefragt, so wird das Lücken so viele Ziffern, nach dem Aussehen des Lückens, als man auf 3. abgefragt. Wenn die 3. Ziffer Differenz man sucht, so wird das Lücken gefunden.

alt. 5. ist. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839.

4. Man den mir die in sub. No. 3 anfallende Ziffern zu den mir
 eig. den Liniest. Stellen des Log. der in 1. Befragung ablesbaren 6
 zifferigen Zahl addire, so gibst diese Summ die Mantissa des
 gesuchten Log., welche man nun noch den gesuchten Exponenten
 beifügt. — 3. L. Man ist Log. 6834.5 ?

1) I^{te} Fregeblatt. 683 1/5

II^{te} Regel Log. 6838. Log. 6837 = 3,8349291 - 3,8348656 = 0,0000635

III. ^{te} Regel. $635 \times 5 = 3175$

IV^{te} Regel. $\log. 6837 = 3,8348656$
 $\frac{317}{1,8310000}$

$5,8348973$ minus Log 68345 =


$$= 4,83489\frac{1}{3}.$$

of I. Shogb. 1783/4

II^{de} Proyel. Log. 1784 - Log. 1783 = 3,254,3949 - 3,254,1543 =
= 2436.

III^{te} Regel. $\frac{2436}{97 \cancel{14}} \cdot (2436 \times 4)$

IV ¹⁰ Kugel Log. 1783 = 3,2511573
974

$$1,2512487 = \text{Log. num } 17834$$


Wenn man gegeben hat die Zahl 56343378 und man will wissen, ob sie eine
 Produktzahl ist oder nicht, so findet man in der Log. Tabelle
 die Log. dieser Zahl heraus zu 7,7508429. Diese Log. ist die gesuchte
 Log. zu bestimmender Primzahl. Die Log. 7,7508429 = Log. 56343378
 56343378 und man findet das Log. dieser Zahl nach obigen
 Tafel folgende Primzahl Log. 8367 = 3,9225698
 Log. 6734 = 3,8282131
 7,7508429 = Log. 56343378

(9267 x 4234 x 434) = Log. 18028674852, man findet das Log.
 zu finden. Log. 9267 = 3,9669392
 Log. 4234 = 3,6264509
 Log. 434 = 2,6374897
 Log. 18028674852 = 10,2511798.



Bestimmung der den gegebenen Logarithmen zugehörigen Zahlen.

§. 1.

Ein numer. Logarithmus heißt ein ziffern
zu finden:

1. Die Aufgabe zu einem gegebenen Log. den zugehörigen Zahl zu finden
ist, den Logarithmus, den der abzählende auflöst man und ist
aus der Wichtigkeit für den gewählten Log. Tafel
man und ist im Handwörterbuch zusammen zufinden
finden, oder als Proportion aus der gelesen werden.

2. Man numer. Log. auf allen Ziffern seiner
Maße genau finden lassen, so ist der
abzählende Zahl den Logarithmus, oder ist der
im Logarithmus den Logarithmus des gegebenen Logarithmus
bestimmt werden muß. Beispiel z. B.

| | | |
|---------------|----------|-----------|
| Log 3,4643405 | zur Zahl | 2913 |
| Log 3,4811559 | " " | 3028 |
| Log 3,9507055 | " " | 8927 |
| Log 3,6537912 | + 2 " " | 0,04506 |
| Log 3,7820424 | - 5 " " | 0,0006054 |

Sind aber auch, in demgemässen Fall ist, förmlich Leinwand
der Mauthsinnstgenoss in der Tafel, so ist man dinguist
kleinere Mauthsinn der selben und in dem ding zu diesem
Zust. so ist es, wenn man die Angaben der einzelnen
Bestandtheile, dingunist kleineren Zust. mal in den Angaben
Log. vorgeordnet. Vorgeordnet. L. zu Log. 2 1225589 dingunist
kleinere Mauthsinn 0, 122551 L. in der Tafel, bei mal in der Zust
5279, Zust. Vorgeordnet ding zu L. in der Zust. 5279, Zust.
5279 und kleiner als 5280 sein.

Dann sind die Angaben 0, 9 Zust. L. in der, so in der Tafel
in diesem Fall, in der Angaben, so in der Tafel
soll zu sein.

Man kann die Angaben Log. 2 8629087, so in der Tafel
L. in der 2, 8629087, so in der Tafel, so in der Tafel
kleinere L. in der. Dann zu diesem ding 1293
sein, so ist ding zu L. in der Zust. 1293, mal in der Zust.

ausfallen, das, das die Logarithmen in der Anwendung dieser Tische
verfälscht:

Wolke 2. Logarithmen zum Log. 1. 5824593.

„Wird diese Mantisse in den Logarithmen aufgeführt und man hat den
Kontingenz 3, so ist die zuwiesse kleinste 5824450 und die
zuwiesse größte 5824595. Der Unterschied in Logarithmen
Differenzen, so ist die Differenz der größten und kleinen
Mantisse = 0,5824595 größte Mantisse

0,5824450 kleinste

0,0001135 = Unterschied Log. Differenz

Auf gleiche Weise ist 0,5824593 = größte Mantisse

0,5824450 kleinste

0,0000143 = 2. Log. Differenz

Da nun die größte Mantisse die Ziffer 3824 und die kleinste
Mantisse 3826 gegeben, welche man in den Logarithmen findet, so bilden
man die Proportion:

1. diff. 2. diff.
0,0001135: 0,0000143 = 1: X.

$X = \frac{1 \times 0,0000143}{0,0001135} = \frac{0,0000143}{0,0001135} = 0,125$, das sind die

ungebunden Mantelstücke zugehörigen Differenz: 3826125.
Daneben die ungebundenen Mantelstücke des ungebundenen Log.

= ist, so wird die zu demselben gehörige Zahl = 38, 26125.

Aus dieser Auflösung lassen sich zum ~~Besten~~ gewöhnlichen
Gebrauch folgende Regeln leicht stellen.

a. Man ziehe aus dem ungebundenen Mantel die zu demselben
gehörigen in der Tafel oben bemerktten Summe die
zu dem zu bestimmenden Differenz als einer die sich ergibt.
Logarithmische Differenz.

b. Man ziehe aus dem zu demselben gehörigen Mantel
den zu demselben gehörigen in der Tafel oben bemerktten
Summe aus.

c.) Wenn die in dem Mantel mit der in c. erhaltenen
Differenz die in der Tafel oben bemerktten Summe aus
dem Mantel die zu demselben gehörigen Zahlen des Quotienten.

d.) Endlich wenn die in dem Mantel die zu demselben gehörigen

zum Aufsteigen in Ansehung der Differenz und das man
 nach der Regel des gegebenen Log. die ganze und die
 Lehrsatz, ist die Ansehung der gegebenen Log. gefunden.

Beispiele.

Was für ein Logarithmus ist zu Log. 0,538426?

I^{te} Regel. 0,538426 gegeben Mantisse

$$\begin{array}{r} 0,5386994 \text{ Merkur} \\ \hline 0,0004532 = 1^{\text{te}} \text{ Log. Differenz} \end{array}$$
 correct. Tafel. h. 1. 3457.

II^{te} Regel. gegebene Mantisse 0,538426

$$\begin{array}{r} \text{Merkur} \quad 0,5386994 \\ \hline 0,0001256 = 2^{\text{te}} \text{ Log. Differenz} \end{array}$$

III^{te} Regel. Diff. der Merkur Mant. 132

$$\frac{132}{1256} = 0,1051$$

IV^{te} Regel 34⁵⁷ 5344 = der dem gegebenen Log. entsprechende
 Zahl.

I

Wahrs. Zeit von Sonnenschein Log. 2, 4548494?

I. R. 2, 4548494 gegeben Mantissa
 2, 4547864 Minimum " corep. Zeit 2830
 1,0000930 = 1^{te} Log. Differenz

II. R. 0, 4549399 geübten Mantissa
 0, 4547864 Minimum "
 0001535 = 2^{te} Log. Differenz

III. R. $\frac{930}{1535} = 0,605$

IV. R. 2,83,0605 = Summe gegeben Log, nach zusammengefasst

II

I. R. 0,8344965 - 2. gegeben Mantissa
 0,8344622 Minimum " corep. Zeit 6848
 0,0000343 = 1^{te} Log. Differenz

II. R. 0,8345253 geübten Mantissa
 0,8344622 Minimum "
 0,0000631 = 2^{te} Log. Differenz

III. R. $\frac{343}{631} = 0,543$

IV. R. 6848543 = 0,06848543.



Einige Anwendungen von der
Logarithmischen Rechnung.

51.

Hammerndiesel helfen den Log. gemeinschaft
Fragestion abzuhelfen soll, so kann man 2 Frageställe
in Lenzburg:

d. Zu angegebenen Zuständen sind $\frac{1}{2}$ Zustände in Proportionalität
zu Lindenberg

b. Wird angegeben, worin man sich ohne zu merkwürdige
 Propositionen zu helfen

2. Du bist nicht der Pflanzengärtner, sondern der Gärtner, und du bist der
 Gärtner, der die Pflanze zu einem Baum erheben will.

Wenns nun Jella minnau das Pünn der Log. ^{Indyten. Abhang}
 virden abgezogen und in Villen in unsern Hof
 geseht.

$$3. \text{ L. } q: x = x: q^5$$

$$x^2 = q \times q^5$$

$$x = \sqrt{q \times q^5} = \text{Log. } x = \frac{\text{Log. } q + \text{Log. } q^5}{2}$$

$$\text{Log. } q = 0,9542425$$

$$\text{Log. } q^5 = 1,9474236 \text{ folglich}$$

$$\text{Summa } \frac{2,9319661}{2} = 1,4659830 \text{ mochte die Zahl } 29,24 \text{ geben,}$$

ist auf dem gegebenen Log.

S. 2.

Wurzel Ausziehungen durch Flüße der Logarithmen.

Wenn wir irgend einer Zahl ein bestimmtes Wurzel durch
Hülfe des Log. ausziehen zu ziehen wann soll, so muß
man von allem dem Log. dieser Zahl die in der Wurzel
Grad der Wurzel ist aus dem Wurzel und muß sodann die rest-
gebliebene Zahl die Quotienten, welche die Wurzel
sein wird.

Wurde $\sqrt[3]{5154}$?

$$\text{Log. } 5154 = \underline{3,7121444} = 1,8560722 = 41,79.$$

Dieser 41,79 = Der 2^{te} oder Ringel von 5154.

Wurde $\sqrt[3]{3318}$?

$$\text{Log. } 3318 = \underline{3,5208464} = 1,1736254 = 14,91 = \text{Der 2te}$$

oder Ringel von 3318.

Fernere Freyspiele.

$$1.) \sqrt[4]{35246} = 13,69$$

$$2.) \sqrt[12]{564348} = 3,016$$

$$3.) \sqrt[5]{\frac{13}{16}} = 0,1819647$$

$$4.) \sqrt[3]{14405\frac{2}{9}} = 26,06$$

$$5.) \left(\frac{9}{8}\right)^{21} = 11,863$$

$$6.) \left(2\frac{5}{6}\right)^9 = 14,766,35$$

Edm

BUCHSTABEN

RECHNUNG

mit

BRÜCHEN.

BLANCHARD

RECHARD

BLANCHARD

Vorfahren

ungleichartige Stücke gleichartig zu machen.

Um ungleichartige Linien gleichartig zu machen, müßte man
man den Fuß und den Stamm des einen Stücks mit dem Stamm
des folgenden und den Fuß und den Stamm des folgenden
mit dem Stamm des folgenden, so in der Folge u. z. L.

$\frac{a}{b}$ in $\frac{c}{d} = \frac{ad}{bd}$ in $\frac{cb}{bd}$ müßte die Linien gleichartig sind.

Wenn $\frac{c}{d}$, $\frac{n}{m}$ in $\frac{r}{p}$ die gegebenen Linien sind $\frac{c}{d} = \frac{cm}{dp}$
 $\frac{n}{m} = \frac{nd}{mp}$ in $\frac{r}{p} = \frac{rd}{mp}$ müßte diese Linien ebenfalls
gleichartig sind.

Wenn $a+b$ in $d-r$ die gegebenen Linien sind
 $\frac{a+b}{c} = \frac{(a+b)p}{cp}$ und $\frac{d-r}{p} = \frac{(d-r)c}{pc}$, müßte diese Linien ebenfalls
gleichartig sind.



Addition in Buchstabengrößen.

Wenn in einem $\frac{a}{b}$ u. $\frac{c}{b}$ zu addieren, so müssen wir
 unter die Ziffern a und c die Ziffern b setzen, und
 dann $\frac{a+c}{b}$ geben.

$$2. \frac{c}{d} + \frac{n}{m} + \frac{p}{r} = \frac{cmp}{dmp} + \frac{ndp}{dmp} + \frac{rdm}{pdm} = \frac{cmp + ndp + rdm}{dmp}$$

$$3. \frac{a+c}{d} + \frac{p+n}{m} = \frac{ad+c}{d} + \frac{pm+n}{m} = \frac{(ad+c)m + (pm+n)d}{dm}$$

Subtraction in Buchstabengrößen.

Wenn man in einem $\frac{a}{b}$ den Bruch $\frac{c}{b}$ zu subtrahieren, so
 muss man die Ziffern c von den Ziffern a abziehen, und
 dann $\frac{a-c}{b}$ geben.

$$2. \frac{cd}{c} - \frac{b}{a} = \frac{da}{ca} - \frac{bc}{ca} = \frac{da-bc}{ca}$$

$$3) \frac{a+a}{b} - \frac{r}{p+q} = \frac{(a+a)(p+q) - br}{b(p+q)}.$$

$$4) a - \frac{b}{d} = \frac{ad - b}{d}.$$

$$5) b - \frac{c}{r+p} = \frac{b(r+p) - c}{r+p}.$$

$$6) \frac{a}{n} - b = \frac{a}{n} - \frac{bn}{n} = \frac{a - bn}{n}.$$

$$7) b + \frac{c}{d} - \left(p + \frac{r}{m}\right) = \frac{bd + c}{d} - \frac{pm + r}{m} = \frac{(bd + c)m - (pm + r)d}{dm}.$$

Multiplication in Bruchsalengrößen.

Der Laus $\frac{b}{d}$ wird mit a multipliziert, man nimmt davon
Zähler mit a multipliziert und den Nenner d mit a
dividiert. Man erhält $\frac{ab}{d}$ d. h. $\frac{ab}{d} : a = \frac{b}{d}$.

$$\frac{a+b}{c-d} \times d = \frac{(a+b)d}{c-d} = \frac{ad+bd}{c-d}.$$

Zwei Laus mit einander zu multiplizieren muß man
auf sein das Produkt aus den Zählern und Nennern
bilden. V. B. z. B. $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

$$2) \frac{b+d}{a} \times \frac{b-d}{n} = \frac{(b+d)(b-d)}{an} = \frac{b^2 - d^2}{an}.$$

$$4) \frac{p}{q} \times \frac{n}{m} \times \frac{c}{d} = \frac{pnc}{qmd}$$

$$5) \frac{b-d}{a+c} \times \frac{h}{g} = \frac{(b-d)h}{(a+c)g}$$

$$6) (b+\frac{a}{d}) \times (r+\frac{n}{m}) = \frac{bd+a}{d} \times \frac{r+\frac{n}{m}}{1} = \frac{(bd+a) \times (rm+n)}{dn}$$

Division mit Bruchstabengrößen.

Was $\frac{a}{m}$ wird durch a dividirt, man kann
auch m durch seine Theiler mit a dividiren oder
dessen a durch m mit a multiplizirt. Denn

$$\text{gibt } \frac{a}{m} : a = \frac{a}{am}$$

$$2. \frac{a}{b} : (c+d) = \frac{a}{b(c+d)}$$

$$\frac{ab}{b} : b = \frac{a}{b}$$

Wenn nun ganze Zahlen mit einem Bruch dividirt
werden, so muß man sie mit dem Nenner des
Bruchs multiplizieren, z. B. $b : \frac{a}{m} = b \times \frac{m}{a} = \frac{bm}{a}$

$$a : \frac{b-c}{d} = a \times \frac{d}{b-c} = \frac{ad}{b-c}$$

$$b : \frac{h}{d+c} = b \times \frac{d+c}{h} = \frac{b(d+c)}{h}$$

Imi Löss, Sabarbanisch man dan dividirt, man man
das Divisorimpfahli. man multipliziert.

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$\frac{b+d}{n} : \frac{a-d}{m} = \frac{b+d}{n} \times \frac{m}{a-d} = \frac{(b+d)m}{(a-d)n}$$

$$\frac{a+b-c}{d} : \frac{h+r}{g} = \frac{a+b-c}{d} \times \frac{g}{h+r} = \frac{(a+b-c)g}{(h+r)d}$$

$$\left(\frac{b+c}{d}\right) : \left(r + \frac{n}{m}\right) = \frac{bd+c}{d} : \frac{rm+n}{m} = \frac{bd+c}{d} \times \frac{m}{rm+n} =$$

$$\frac{(bd+c)m}{(rm+n)d}$$



VERHALTNIS

Verhältniß-Lehre in Buchstabengrößen

Das allgemeine Verhältniß zweier Größheiten ist:
 $a - b = d$ wenn a das 1^{te} Glied, b das 2^{te} Glied in der Differenz
 bedeutet. Wenn a größer als b oder $a = b$ oder a kleiner
 als b ist, so heißt das Verhältniß eine Größenzunahme
 kleiner oder Verhältniß eine Gleichheit oder eine
 Abnahme zum Größeren.

In jedem Falle ist $a = b + d$ und $b = a - d$.

Das allgemeine Verhältniß dreier Größheiten ist:

$a : b = c$ wenn a das 1^{te} Glied, b das 2^{te} und c das 3^{te} Glied
 ist, welches bedeutet, daß a größer oder kleiner als b ist, je nachdem
 a größer oder kleiner als b genommen wird.

Zugedann falls $a = \frac{b}{c}$ u. $b = \frac{a}{c}$, so daß auch die
 beiden Glieder der Gleichung $a = \frac{b}{c}$ und $b = \frac{a}{c}$
 und die Gleichung $a = \frac{b}{c}$ und $b = \frac{a}{c}$ ist
 die Gleichung $a = \frac{b}{c}$ und $b = \frac{a}{c}$ ist
 S. 2.

Allgemeine Sätze der arithmetischen Proportion.

Wenn $a - b = d$ u. $m - n = d$, so sind die Verhältnisse
 von a zu b u. von m zu n gleich, d. h. es ist
 $\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$ oder $a \cdot n = b \cdot m$.
 Umgekehrt, wenn $\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$, so ist $a - b = d$ u. $m - n = d$.

Wenn $a + n = b + m$, dann ist
 die Gleichung $a - b = d$ u. $m - n = d$ erfüllt.
 Umgekehrt, wenn $a - b = d$ u. $m - n = d$,
 so ist $a + n = b + m$.
 Wenn $a + n = b + m$, dann ist
 die Gleichung $a - b = d$ u. $m - n = d$ erfüllt.
 Umgekehrt, wenn $a - b = d$ u. $m - n = d$,
 so ist $a + n = b + m$.

äußeren Glied $= (b+d) + m = b(m+d)$.

Beispielsweise: Wenn $2, 3$ in arithmetischer Progression
sind, so ist die Summe $2+3=5$ gleich dem Produkt $2 \cdot 3=6$ aus dem
ersten Glied 2 mit der Anzahl 3 der Glieder.

Wenn $c-d = a-d$ so muß $a = d + a - c$ sein.

Sei $a-b = d$ so muß $a = d + b$ sein.

In $a-d = b-h$ ist $a = b + h - d$.

Allgemeine Sätze der geometrischen Proportion.

Wenn $a:b = c:d$ so sind diese Verhältnisse
einander gleich und es folgen die Proportionen:

$$a:b = m:n$$

Wenn $a:b = m:n$ so muß auch $a:n = b:m$ sein.

Wenn das Verhältniß $a:b$ das Quotienten $\frac{a}{b}$ und
das Verhältniß $m:n$ das Quotienten $\frac{m}{n}$ gleich.

$$\text{Es muß sein } \frac{a}{b} = \frac{m}{n}$$

Wenn die drei Längen gleichnamig gemacht, so ist $\frac{an}{bn} = \frac{cm}{bn}$
 und folglich $an = cm$; da gleiche Längen, wenn sie
 gleiche Thanne haben, ein gleiches Quäntel haben müssen.

Setz $a:b$ ein gegebenes Verhältniß, so ist auch
 $a:b = ad:bd = ad:cd = \frac{a}{n} : \frac{b}{n} = \frac{a}{nm} : \frac{b}{nm}$.

Setz $a:d = h:g$, so ist auch $a:h = d:g$. Dann a, h
 sind ein gleichnamiges Verhältniß zu g .

Die Proportion $\frac{a}{n} : \frac{b}{m} = \frac{d}{c} : \frac{h}{g}$ läßt sich auf die gleiche
 Verhältnisse bringen. Glinde man die
 folgenden Proportionen: $a : \frac{bn}{m} = \frac{d}{c} : \frac{h}{g}$ oder $am : bn = \frac{d}{c} : \frac{h}{g}$
 oder $am : bn = \frac{dg}{c} : h$ oder $am : bn = dg : ch$.

Wenn die Proportion $a:b = c:d$
 und $e:f = g:h$ gegeben sind, so
 muß auch sein $ae:bf = cg:dh$, welche man
 ein zusammengefügtes Proportion nennt.



Lejon

von den

Mangel (Größen)

Addition und Subtraction in Wurzelgrößen.

Wurzelgrößen einer Größe die Wurzelgrößen
einanderfall, so sind für Wurzelgrößen z. B. $\sqrt{a}$, $\sqrt[3]{b}$, $\sqrt[m]{n}$ p.p.
Jeder gegebenen Wurzelgrößen kann dieselbe Potenzgrößen
dargestellt werden, malte sich gleich, da Größern mit
Lehrsatz zusammenbau, Wurzelgrößen sind, so ist z. B. $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$,
 $\sqrt[3]{b} = b^{\frac{1}{3}}$, $\sqrt{ab} = ab^{\frac{1}{2}}$.

Wurzelgrößen sind ungleichförmig, wenn die aufgezählten
Wurzelgrößen ungleichförmig Graden sind. z. B. $\sqrt{a}$, $\sqrt[5]{b}$, $\sqrt[m]{n}$ oder
 $\sqrt[7]{b}$, $\sqrt{aa}$ p.p.p.

Gleichförmig sind sie aber, wenn die Wurzelgrößen gleichförmig
sind. z. B. $\sqrt{a}$, $\sqrt{a}$, $\sqrt[3]{b}$, $\sqrt[3]{b}$ p.p.p.

Ungleichförmige Wurzelgrößen gleichförmig zu machen
kann man, wenn man sie in Potenzen mit ungeraden
Exponenten, macht diese Lehrsatz gleichförmig und bilden nun
aus diesen neuen Potenzen die minderen die aus
sich finden Wurzelgrößen.

Es sey gegeben $\sqrt[3]{a}$ u. $\sqrt[3]{a}$, so ist $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$ u. $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$,
 Da nun die $\frac{1}{3}$ u. $\frac{1}{3}$ nicht gleich sind, so
 wird $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ u. $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ folglich nun wird $a^{\frac{1}{3}}$ u. $a^{\frac{2}{6}}$ u. $a^{\frac{2}{6}} = a^{\frac{2}{6}}$,
 das ist $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{2}{6}}$ u. $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{2}{6}}$, nach dieser Regel
 gleichartig gemacht sind, so ist $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{2}{6}}$
 $\sqrt[3]{a}$ u. $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{2}{6}} = \sqrt[3]{a}$.

Auf solche Weise kann man auf jedem andern Beispiel
 gleichartig machen.

$$h. \sqrt[3]{a} + 3. \sqrt[3]{a} - 7. \sqrt[3]{a}$$

$$a. \sqrt[3]{b} + c. \sqrt[3]{b} = (a+c). \sqrt[3]{b}$$

$$b. \sqrt[3]{a} + c. \sqrt[3]{a} - d. \sqrt[3]{a} - h. \sqrt[3]{a} = (b+c-d-h). \sqrt[3]{a}$$

$$\begin{aligned}
 8. \sqrt[3]{2} + 3. \sqrt[3]{2} - 4\frac{1}{2}. \sqrt[3]{2} &= (8+3-4\frac{1}{2}). \sqrt[3]{2} = \\
 &= (11-4\frac{1}{2}). \sqrt[3]{2} = 6\frac{1}{2}. \sqrt[3]{2}.
 \end{aligned}$$

$$3. \sqrt[3]{5} - 4. \sqrt[3]{a} + 7. \sqrt[3]{b} - 11. \sqrt[3]{g} + 5. \sqrt[3]{f}$$

$$- 5. \sqrt[3]{5} + 3. \sqrt[3]{a} - 5. \sqrt[3]{b} - 3. \sqrt[3]{g} + 2. \sqrt[3]{f}$$

$$6. \sqrt[3]{5} - 5. \sqrt[3]{a} - 3. \sqrt[3]{b} - 8. \sqrt[3]{g} - 4. \sqrt[3]{f}$$

$$+ 4. \sqrt[3]{5} - 6. \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} \quad \times \quad + 2. \sqrt[3]{f}$$

Subtraction.

$$148. \sqrt[3]{7} - 4. \sqrt[3]{7} = 14. \sqrt[3]{7}$$

$$5. \sqrt{a} - 7. \sqrt{a} = -2. \sqrt{a}$$

$$a. \sqrt{b} - c. \sqrt{b} = (a - c). \sqrt{b}$$

$$3b. \sqrt{a^2} - 2b. \sqrt{a^2} = b. \sqrt{a^2}$$

$$I + 12. \sqrt{3} - 4. \sqrt[3]{7} + 3. \sqrt[5]{6} - n. \sqrt{a} + \sqrt[3]{7}$$

$$\underline{+ 7. \sqrt{3} + 2. \sqrt[3]{7} - 1. \sqrt[5]{6} + 3. \sqrt{a} - \sqrt[3]{7}}$$

$$+ 5. \sqrt{a^3} - 6. \sqrt[3]{7} + 10. \sqrt[5]{6} - (n-3). \sqrt{a} + 2. \sqrt[3]{7}$$

$$II. \quad \begin{array}{r} + 3. \sqrt{a} - 5. \sqrt[3]{6^2} + 2. \sqrt{a} - \frac{1}{3}. \sqrt[3]{p} + \sqrt[5]{\frac{5}{4}} \\ - 8. \sqrt{a} - 12. \sqrt[3]{6^2} + 2. \sqrt{a} - 4. \sqrt[3]{p} + 6. \sqrt[5]{\frac{5}{4}} \\ \hline \end{array}$$

$$+ 11. \sqrt{a} + 7. \sqrt[3]{6^2} + 3\frac{2}{3}. \sqrt[3]{p} - 5. \sqrt[5]{\frac{5}{4}}$$

Be. Wenn a eine gewisse Zahl bedeutet so ist bekanntlich
 $\sqrt{a}$ die kleinste mögliche Größe, weil jedes Quadrat, es
 selbst oder eine gewisse oder negative Anzahl
 jedesmal positiv sein muß. Da nun $\sqrt{a} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{1}$
 so stellt sich $\sqrt{a} \cdot \sqrt{1}$ jedesmal mögliche Größen dar.

Im Allgemeinen kann man bemerken, daß sich
 alle imaginären Größensubstanzien Summa $a + b \cdot \sqrt{-1}$
 bringen lassen, wobei a u. b reelle Größensubstanzien
 sind.

Addition

$$\begin{array}{r} 10 \cdot \sqrt{-1} a \\ 3 \cdot \sqrt{-1} a \\ 5 \cdot \sqrt{-1} a \\ \hline 18 \cdot \sqrt{-1} a \end{array} \quad a \cdot \sqrt{-1} d + b \cdot \sqrt{-1} d + c \cdot \sqrt{-1} d = (a + b + c) \cdot \sqrt{-1} d.$$

Subtraction

$10 \cdot \sqrt{-1} a$ minus $7 \cdot \sqrt{-1} a$ gibt zwar Resultat $3 \cdot \sqrt{-1} a$.

$$a \cdot \sqrt{-1} d - b \cdot \sqrt{-1} d = (a - b) \cdot \sqrt{-1} d.$$

$$\underline{3 \cdot \sqrt{-1} 4 - (\sqrt{-1} 25)} + 4 \cdot \sqrt{-1} 9 = 13 \cdot \sqrt{-1} 1 \text{ denn}$$

$$3 \cdot \sqrt{-1} 4 = 3 \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1} = 6 \cdot \sqrt{-1} 1 \text{ denn}$$

$$\sqrt{-1} 25 = \sqrt{25} \cdot \sqrt{-1} = 5 \cdot \sqrt{-1} 1 \text{ in. auslief}$$

$$4 \cdot \sqrt{-1} 9 = 4 \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} = 12 \cdot \sqrt{-1} 1. \text{ Dasselbe ist dann} =$$

$$6 \cdot \sqrt{-1} 1 - 5 \cdot \sqrt{-1} 1 + 12 \cdot \sqrt{-1} 1 = 13 \cdot \sqrt{-1} 1 - (5 \cdot \sqrt{-1} 1) = 13 \cdot \sqrt{-1} 1.$$

Beweis

Multiplication und Division in Wurzelgrößen.

$$3. \sqrt[3]{4} \times 4. \sqrt[3]{4} = 12 \sqrt[3]{4} \quad / \quad 2. \sqrt[3]{3} \times 3. \sqrt[3]{5} \times 10. \sqrt[3]{5} = 60. \sqrt[3]{5}.$$

$$a. \sqrt[3]{b} \times d. \sqrt[3]{c} = (a. d). \sqrt[3]{bc}$$

$$3. \sqrt[3]{a} \times 2. \sqrt[3]{b} \times 8. \sqrt[3]{c} = 48. \sqrt[3]{abc},$$

Und aber die Wurzelgrößen der Substantien nachfinden, so
müssen wir sie in gleiche Theile theilen und nachher wieder zusammen
setzen.

$$3. \sqrt[3]{4} \times 4. \sqrt[3]{5} = 3. \sqrt[3]{4} \times 4. \sqrt[3]{5} = 12. \sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{5} = 12. \sqrt[3]{4 \times 5} = 12. \sqrt[3]{20}.$$

Dem Wurzelgrößen mit einander zu dividieren, wenn
gleiches die Wurzelgrößen haben, dividieren wir die
Wurzelgrößen nachher und finden die GröÙen der
Theile. z. B. $12. \sqrt[3]{a} : 3. \sqrt[3]{a} = \frac{12 \times \sqrt[3]{a}}{3 \times \sqrt[3]{a}} = 4 \sqrt[3]{a} = 4. a.$

$$m. \sqrt[3]{a^n} : n. \sqrt[3]{a^q} = \frac{m}{n} \times \frac{\sqrt[3]{a^n}}{\sqrt[3]{a^q}} = \frac{m}{n} \times \sqrt[3]{\frac{a^n}{a^q}} = \sqrt[3]{\frac{a^n}{a^q}}.$$

Wenn die Wurzelgrößen nachfinden sind, müssen wir sie
in gleiche Theile theilen und nachher wieder zusammen
setzen. z. B.

$$\sqrt[m]{a} : \sqrt[n]{b} = a^{\frac{1}{m}} : b^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{n}{mn}} : b^{\frac{m}{mn}} = \sqrt[mn]{a^n} : \sqrt[mn]{b^m} = \sqrt[mn]{\frac{a^n}{b^m}}.$$

$$\sqrt[3]{7} : \sqrt[2]{5} = 7^{\frac{1}{3}} : 5^{\frac{1}{2}} = 7^{\frac{2}{6}} : 5^{\frac{3}{6}} = \sqrt[6]{7^2} : \sqrt[6]{5^3} = \sqrt[6]{\frac{49}{125}}.$$

• Multiplication und Division in eingebildeten
Größen,

$$\sqrt{a} \times 4 \cdot \sqrt{a} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{a} = 2 \sqrt{a} = 2 \sqrt{a^2} = 2a. \text{ Dann}$$

$$\sqrt{a} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{1} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{1^2} = \sqrt{a^2} : \sqrt{1}.$$

$$\sqrt{ab} : \sqrt{a} = \sqrt{b}.$$

$$b : \sqrt{1} : c : \sqrt{1} = \frac{b}{c}.$$

$$1 : \sqrt{1} = - \sqrt{1}$$

$$a : b \cdot \sqrt{1} = - \frac{a}{b} \cdot \sqrt{1}.$$



U. L. S. R. L.

von den

U. L. S. R. L. S. R. L. S. R. L.

L. S. R. L. S. R. L.

215 123 2

123 123

123 123 123 123 123 123

Von Gleichungen.

Es ist bekannt, daß wir nur die unmittelbare Größe mit unserer
Operationen ausrechnen können, so z. B. die Größe A als die
Summe von B und C und D als das Produkt von E in F und
als das Produkt von G und H und I als die Quotient von
 J in K und L und M als die Differenz von N und O und
auf diese Weise und so weiter, und das kann das die Größe
auf eine Weise ausrechnen, so wie man weiß, daß man
das Gleichung überseht, und so ist man dann dazwischen
und weiß, man und das selbe, daß die Größe ausrechnen
wissenschaftlich ^(unbegreiflich) zu wissen, man weiß, daß jede
Gleichung 2 Teile haben muß, nämlich natürliches, daß
jede diese Teile ausrechnen Gleichung haben kann.
Da man die unmittelbare Größe ausrechnen mit dem
ersten die unmittelbare abrechnen mit dem letzten die
haben die alle zu bezeichnen es liegt, so sind die in
einer Gleichung vorhanden bekannt und das man
bekannten Gleichung nicht zu bezeichnen.

Polenzst. 1.

Die Gleisungswand des 2ten Grades ist ein quadratisches
in der 3ten Reihe.

Es sind 6 Gleisungswand 1ten, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 6ten
Grades gegeben.

Gleisungswand 1ten Grades ist ein quadratisches
Gleisungswand.

Es sind 6 Gleisungswand 1ten, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 6ten
Grades.

Die 6ten Grades, 1ten Grades, 2ten Grades, 3ten Grades, 4ten Grades, 5ten Grades
Gleisungswand, 1ten Grades, 2ten Grades, 3ten Grades, 4ten Grades, 5ten Grades, 6ten Grades
Mann in der quadratischen Gleisungswand 1ten Grades
Quadrat des Kubikums, ist das Kubikum selbst
nicht mehr vorhanden, so ist die quadratische Gleisung
nicht mehr.

Es sind 6 Gleisungswand 1ten Grades, 2ten Grades, 3ten Grades, 4ten Grades, 5ten Grades, 6ten Grades
1ten Grades, 2ten Grades, 3ten Grades, 4ten Grades, 5ten Grades, 6ten Grades
nicht mehr vorhanden, so ist die quadratische Gleisung.

Genug giebt es annehmliche und sichere Gleichungen.

Der Algebra nachstehende Grundsätze sind die wichtigsten
in demselben, welche sich ergeben. Das erste ist
zwischen bekannten und unbekanten Größen eine Gleichung
das letzte eine Gleichung der Gleichungen zu finden. ^{letztes} V. d. L.
Nun ist das folgende Gesetz, welches die Eigenschaften hat, daß
es die Gleichheit in sich selbst zusammen
addieren. Es ist also ein Gesetz, welches
nicht kommt, daß die beiden abwechselnd ⁱⁿ a und b
mit sich gegeben das selbe ist. Diese beiden
Größen nach einer Gleichung werden
man darf.

Die vorgegebene Aufgabe muss durch Hilfen der Gleichungen
gelöst werden, dass man diese Gleichungen in Längengraden
jeweils auf der Grundkarte nachvollzieht und die Gleichung
muss den vollkommenen Aufwands je nach Aufgabe sein.

Die vorgegebene Aufgabe soll durch Hilfen der Gleichung
gelöst werden, dass man alle vorkommenden Gleichungen
zu bilden, dass für die Längengraden, welche gegeben sind, alle
kommensurabel sind.

Die vorgegebene Aufgabe ist ein kubisches Polynom
Hilfen, die Hilfen sind die Hilfen zusammen, die Hilfen, alle
je nach kubischen Polynom, das gegeben ist. Man muss diese
Kubischen = $x^3 + 1$ ist $\frac{x}{2} =$ die Hilfen $\frac{x}{3} =$ ist die Hilfen
 $\frac{x}{4}$ ist die Hilfen, dass man diese Hilfen der Hilfen zusammen
sollen, so gibt die Aufgabe folgende: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} =$ die Hilfen
von $x + 1$. dass die Gleichung = $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = x + 1$, welche
die vorgegebene Längengraden der Gleichung vollkommen
sind.

Lehrstet man diese Gleichung, so stellt sich, daß die über-
kommene Größe mit ungenauem bekannten Größenaus-
druck ist und man immer noch weiter kommt.

Man muß daher die Gleichung, aus der das Resultat gegen
die Lehrformel, stamm, auflösen.

Es ergibt sich, daß man die Gleichung auflösen muß, wie folgt,
als man das Resultat in bekanntem Größenaus-
druck hat.

• Auf dem Wege der Analysis, kann man mit Hilfe
Größengleichungen ausrechnen, was man
mit den Gleichungen Größengleichungen Resultat ausfällt.

a.) Man kann die beiden Theile der ^{Gleichung} Gleichung addieren
und sich das Resultat, so bleibt die Gleichung ist die beiden Theile
unverändert.

b) Sind nur alle Glieder des gegebenen Gleichungssystems
einer Größenvollständigkeit nach identisch, so sind die Gleichungen
des Gleichungssystems identisch

c) Lasse man die Gleichheit der Gleichungen festsetzen,
man kann bei der Gleichheit der Gleichungen festsetzen
und sich für die Gleichung der Gleichungen der Gleichungen. z. B.
die Gleichung man: $A + A = B$ so ist man das die A durch
Addition verbunden sind. Man kann bei der Gleichheit der
Größe A setzen so gibt dies $A = B - A$. Man ist sicher
daß $+A$ auch A durch abgezogen werden ist, das ist
in der anderen Teil der Gleichung mit $-A$ gesetzt werden.

Hieraus ergibt sich die allgemeine Regel:

A. Alle positiven Größen können aus der Gleichung zu
nehmen und man kann Teil der Gleichung weglassen
und als negativen in der anderen anzusetzen werden
und so umgekehrt.

b.) Man kann jede negative Größe in der anderen
Teil der Gleichung weglassen, man muss in der
anderen Teil als eine positive Größe anzusetzen.

Wenn die gegebenen Gleichung $\frac{d}{a} = d$ für die Quadratsumme
 d nicht vollkommen besteht. Dann nimmt aus dem Laufen $\frac{d}{a}$ die
 Grösse d zu, so fällt der Bruch $\frac{d}{a}$ mit d mülbig zusammen und die
 Summe der Brüche wird der Teil der Gleichung mülbig d . d. h.
 $\frac{d}{a} + d = d + d$. $d = d + d$. Wenn die Regel:

Wenn in einer Gleichung Laufen in der Markierung,
 so muß der Bruch $\frac{d}{a}$ mit d mülbig zusammenfallen, so daß
 gefast man das, daß man jedes Glied in der Gleichung
 der Gleichung mit diesem mülbig lassen kann. Dann
 geben die Brüche mülbig zusammen.

Ein mülbiges Regel sagt:

Wenn irgend ein Glied der Gleichung einen Bruch
 enthält, so kann das selbe dadurch mülbig gefast man das.
 daß man jedes Glied der Gleichung mit diesem
 Bruch dividirt, z. B. $a + d = b + c + d$ man dividirt $a = \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + \frac{d}{a}$
 $(b + c + d) = a$.

Wenn die Gleichung $a^2 = a + b$ so muß man a selbst
 ansetzen und a^2 in der Gleichung mülbig zusammenfallen.
 Wenn das geschehen ist, so muß die Regel mülbig sein.

wird immer gleich x^2 ist die Quadratwurzel gegeben, man
 findet $a+b$. Dies gibt $x = \sqrt{a+b}$. Man hat die Regel gesagt:
 Wenn das Quadrat des Unbekannten in einem
 Trinomial, nach, so muß man die beiden Seiten der
 Quadratwurzel ziehen um das Unbekannte selbst zu
 bestimmen.

Hätte man $x = c+d$ so müßte die Wurzel zum
 Quadrat erhoben werden, man müßte x selbst zu
 erhalten, um oben die Gleichheit beider Seiten beständig
 zu haben, man müßte $c+d$ quadrieren, das
 $x = (c+d)^2 = c^2 + 2cd + d^2$. Man hat gesagt, die Regel:

Wenn die Quadratwurzel des Unbekannten in einem
 bekannten Graden gleich ist, so müssen die beiden Seiten der
 Quadratwurzel erhoben werden, um das Unbekannte selbst
 zu bestimmen.

Einige Beispiele.

$$I \quad 2x - a + b = d + h$$

$$2x = d + h + a - b$$

$$2x = d + h + a - b$$

$$x = \frac{d + h + a - b}{2}$$

$$II \quad 3x + ax = b - c$$

$$x(3+a) = b - c$$

$$x = \frac{b - c}{3 + a}$$

$$\text{III } a.y - \frac{c}{d} = b - h$$

$$a.y = b - h + \frac{c}{d}$$

$$y = \frac{b}{a} - \frac{h}{a} + \frac{c}{a.d}$$

$$y = \frac{b-h}{a} + \frac{c}{ad}$$

$$\text{IV } 3x - \frac{a}{b} = dx - h$$

$$3x = dx - h + \frac{a}{b}$$

$$3x - dx = -h + \frac{a}{b}$$

$$x(3-d) = -h + \frac{a}{b}$$

$$x = \frac{-h}{3-d} + \frac{a}{3b-bd}$$

$$x = \frac{a}{3b-bd} + \frac{-h}{3-d}$$

$$\text{V } \frac{ax}{b} = c + \frac{dx}{n}$$

$$ax = bc + \frac{bdx}{n}$$

$$anx = bcn + bdx$$

$$anx - bdx = bcn$$

$$x.(an-bd) = bcn$$

$$x = \frac{bcn}{an-bd}$$

$$\text{VI } ax^2 = b+c+d$$

$$x^2 = \frac{b+c+d}{a}$$

$$x = \sqrt{\frac{b+c+d}{a}}$$

$$\text{VII } \sqrt{x+b} - a = m$$

$$\sqrt{x} - a = m - b$$

$$\sqrt{x} = m - b + a$$

$$x = a - b + m$$

$$x = a^2 - 2ab + 2am + b^2 - 2bm + m^2$$

$$\text{VIII } 5x^2 + \frac{x^2}{2} = a + 4x^2$$

$$10x^2 + x^2 = 2a + 8x^2$$

$$10x^2 + x^2 - 8x^2 = 2a$$

$$3x^2 = 2a$$

$$x^2 = \frac{2a}{3}$$

$$x = \sqrt{\frac{2a}{3}}$$

$$\text{IX } 3.2x - 0.87 = 6.4x - 6.2$$

$$3.2x - 0.87 + 6.2 = 6.4x$$

$$-0.87 + 6.2 = 6.4x - 3.2x$$

$$+ 5.33 = 3.2x$$

$$x = 1.665$$

$$I \quad 3x + 8 - \frac{2}{3}x = 5x - 4$$

$$3x + 8 - \frac{2}{3}x - 5x = -4$$

$$3x - \frac{2}{3}x - 5x = -4 - 8$$

$$-2x - \frac{2}{3}x = -12$$

$$-\frac{6}{3}x - \frac{2}{3}x = -12$$

$$-\frac{8}{3}x = -12 \quad \text{Aufg. gleichung mit 1 multiplizieren gibt}$$

$$\frac{8}{3}x = 12$$

$$8x = 12 \cdot 3 = 36$$

$$x = \frac{36}{8} = 4\frac{4}{8} = 4\frac{1}{2}$$

$$II \quad 2x - \frac{4x}{3} + \frac{2x}{5} + x = \frac{2}{3}$$

$$3x - \frac{20x + 6x}{15} = \frac{2}{3}$$

$$45x - 20x + 6x = \frac{30}{3}$$

$$45x - 26x = \frac{30}{3}$$

$$19x = \frac{30}{3} = 10$$

$$x = \frac{10}{19}$$

$$III \quad 16x - \frac{x}{5} = \frac{x}{4} + 8 + 3x$$

$$16x - \frac{x}{5} - \frac{x}{4} - 3x = 8$$

$$80x - x - 5x - 15x = 40$$

$$320x - 4x - 5x - 60x = 160$$

$$x \cdot (251) = 160$$

$$x = \frac{160}{251}$$

$$XIII \quad \frac{x}{2} + \frac{x}{4} - \frac{x}{5} = 4x - 40$$

$$\frac{20x + 10x - 8x}{40} = 4x - 40$$

$$\frac{22x}{40} = 4x - 40$$

$$\frac{11x}{20} = 4x - 40$$

$$11x = 80x - 800$$

$$-80x - 11x = 800 \quad \text{y. 1000 machen}$$

$$69x = 800$$

$$x = \frac{800}{69}$$

$$XIV \quad x = \frac{a+b}{d} - \frac{hx}{n}$$

$$x + \frac{hx}{n} = \frac{a+b}{d}$$

$$nx + hx = an + \frac{bn}{d}$$

$$x \cdot (n+h) = \frac{an + \frac{bn}{d}}{d} = \frac{and + bn}{d} = \frac{n \cdot ad + b}{d}$$

$$x = \frac{n \cdot (ad + b)}{d \cdot (n+h)}$$

$$XV. \frac{x}{n} - \frac{ax}{m} + d = bx$$

$$\frac{x}{n} - \frac{ax}{m} = bx - d$$

$$\frac{x}{n} - \frac{ax}{m} - bx = -d$$

$$\frac{mx}{mn} - \frac{anx}{mn} - bx = -d$$

$$\left(\frac{m-an}{mn}\right)x - bx = -d$$

$$\left(\frac{m-an}{mn} - b\right)x = -d$$

$$m-an-bmn \cdot x = -dmn$$

$$x = \frac{-dmn}{m-an-bmn}$$

$$XVI. \frac{x}{a} + \frac{bx}{c} - \frac{dx}{n} = h+g$$

$$\frac{cnx + abnx - acdx}{acn} = h+g$$

$$cnx + abnx - acdx = h+g \times acn$$

$$x.(cn+abn-acd) = h+g \times acn, ah-a = bd - \frac{bch+bc^2}{(d-ch+e).n}$$

$$x = \frac{h+g \times acn}{cn+abn-acd}$$

$$XVII. \frac{a}{x} + b = d + \frac{1}{x}$$

$$\frac{a}{x} + b - \frac{1}{x} = d$$

$$\frac{a}{x} - \frac{1}{x} = d - b$$

$$\frac{1}{x}(a-1) = d-b$$

$$a-1 = dx - bx$$

$$a-1 = (d-b)x$$

$$x = \frac{a-1}{d-b}$$

$$XVIII. \frac{ax}{b+x} = \frac{dx}{h-1} - cx$$

$$\frac{aha - ax}{bx} = dx - cha + cx$$

$$\frac{ah-a}{bx} = d - ch + c$$

$$ah-a-bd = -bch+bc^2 + (d-ch+c).n$$

$$ah-a-bd+bch-bc^2 = (d-ch+c).n$$

$$\frac{ah-a-bd+bch-bc^2}{d-ch+c} = n$$



$$XII \quad \frac{2a-x}{n} - 8 = 5x+2$$

$$\frac{2a-x}{n} = 5x+2+8$$

$$\frac{2a-x}{n} - 5x = 2+8 = 10$$

$$2a-x-5nx = 2n+8n = 10n$$

$$x \cdot (-1-5n) = 10n-2a$$

$$x = \frac{10n-2a}{(-1-5n)}$$

$$x = \frac{2a-10n}{1+5n}$$

$$XIII \quad \frac{n}{x} + 6x = \frac{5}{8} - d + i$$

$$n+6x = \frac{5x}{8} - dx + x$$

$$8n+86x = 5x - 8dx + 8x$$

$$86x - 5x + 8dx - 8x = -8n$$

$$x \cdot (86-5+8d-8) = -8n$$

$$x \cdot (86+8d-13) = \frac{-8n}{86+8d-13} = \frac{-8n}{8(b+d)-13}$$

$$XIV \quad \frac{bx}{a+1} - d = ax-3$$

$$\frac{bx}{a+1} = ax-3+d$$

$$\frac{bx}{a+1} - ax = d-3$$

$$bx - a^2x - ax = (d-3) \cdot (a+1)$$

$$x \cdot (b-a^2-a) = (d-3) \cdot (a+1)$$

$$x = \frac{(d-3) \cdot (a+1)}{b-a^2-a}$$

$$XV \quad ax^2 - bx^2 + dx = (3a+b) \cdot x - hx^2$$

$$ax - bx + d = (3a+b) - hx \quad (\text{surfact individuellement})$$

$$ax - bx + hx = 3a+b-d$$

$$x \cdot (a-b+h) = 3a+b-d$$

$$x = \frac{3a+b-d}{a-b+h}$$

$$XVI \quad \frac{ax}{c} + 3x = \frac{bx}{c} + 5x + 1$$

$$\frac{ax}{c} + 3x - \frac{bx}{c} - 5x = 1$$

$$\frac{ax}{c} - \frac{bx}{c} + 3x - 5x = 1$$

$$ax - bx + 3cx - 5cx = c$$

$$x \cdot (a-b+3c-5c) = c$$

$$x = \frac{c}{a-b-2c}$$

Aufgabe.

Man soll eine Zahl finden, deren halbes, Drittel und
 Viertel zusammen nur 5 betragen. Soll die
 Zahl sein?

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4} = \text{Zahl} - 5$$

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = x - 5$$

$$12x + 8x + 6x = x - 5$$

$$24x + 8x + 6x = 24x - 120$$

$$26x = 24x - 120$$

$$26x - 24x = -120$$

$$2x = -120$$

$$x = -\frac{120}{2} = -60.$$

II. Aufgabe. Alexander der Große sprach zu seinem
 Jüngsten Sohne, dem Könige, Elites sagte: ich
 bin 4 Jahre älter als du bist, und alle 5 Jahre
 füge ich hinzu. Mein Vater ist 96 Jahre alt. so
 alt als ich 3 Jahre war. Mein alter
 gerade vorhin.

$$x + (x+2) + (2x+6) = 96$$

$$2x+2+2x+6=96$$

$$2x+2x=96-2-6$$

$$4x=96-2-6$$

$$x = \frac{96-2-6}{4} = \frac{88}{4} = 22$$

22 Jafur. P. Hagnstein alt

24, 5. " Alexander alt

54 " " Helmut alt

Summe 96 Jafur. P. Hagnstein alt

III Aufgabe. Was ist die Summe der ersten 100 natürlichen Zahlen? Die Summe der ersten 100 natürlichen Zahlen ist 5050.

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = x + 2$$

$$\frac{12x + 8x + 6x}{24} = x + 2$$

$$12x + 8x + 6x = 24x + 48$$

$$24x - 24x = 48$$

$$-24x = 48$$

$$x = \frac{48}{-24} = -2$$

IV Aufgabe. Wenn man die Summe der ersten 100 natürlichen Zahlen berechnet, so erhält man 5050. Die Summe der ersten 100 natürlichen Zahlen ist 5050.

in dem Tagewerk dann noch verarbeitet $\frac{1}{4}$ h. für die das Tagewerk
 mit einem auf Abzug des 60 Tagewerk zu folgendes gegeben
 Abrechnung 24 h. ausfällt, so auch für die Tagewerk: Minus
 Tagewerk verarbeitet und minus wird nun zu sein ist Sub?

$$24 = \frac{x^2}{4} - (60 - x) \cdot \frac{1}{4}$$

$$24 = \frac{3x}{4} - \frac{(60 - x)}{4}$$

$$24 = \frac{3x - 60 + x}{4}$$

$$96 = 3x - 60 + x$$

$$96 = 4x - 60$$

$$96 + 60 = 4x$$

$$x = \frac{96 + 60}{4} = \frac{156}{4} = 39 \text{ Tagewerk}$$

Auflösung:

Setzt man die Zahl der Arbeitstage = x , so wird dann durch 60 x
 die Tagewerk verarbeitet und dann noch verarbeitet Sub. Die
 Aufgaben sind jetzt damit zu beschäftigen, daß gegeben ist
 sein werden, mit der Hilfe der anderen und man
 mit allen Begegnung Sub. und die Tagewerk Sub
 abgezogen und der Rest = 24 Sub. Von der Hilfe der
 anderen Tagewerk 2 h. ausfällt und x Tagewerk verarbeitet Sub so Sub.

Lauge für Lauge 2 x A. Meissner von 60 Tagen ferner 60 d Tage
mit Garabild und ferner für das g.g.f. 60 d H. zur Zugabe;
Sinnvoll, soll sich die Flüssigkeit oben auflösen. —
V L M i n

[illegible]

Auflösung.

Die Zeit aller zu liefernden Taffel = a
 Die Zeit der Taffel der an der Tafel = a , für die Zeit der
 Taffel der zu machenden a - Taffel man kann sich für die
 ebenfalls inbekannten Zeit kann man inbekannte Größe
 zu setzen z. B. z. der Grundmorale die Bildung der
 Gährung bezieht, dass man den Goldbezug der ganzen
 Lieferung auf den goldenen Preis überträgt.
 Man setzt den Preis eines Taffel der Taffel a = b
 den, einen Taffel der zu machenden a = c , den

Geldbetrag der ganzen Lieferung = d ist das Preis aller
 Süsses des kassierten Vorkaufes = ba und das Preis aller
 Süsses des $\frac{1}{2}$ des Vorkaufes = $ac - ca$. Von dieser Geldbetrag
 ist die Differenz der, mehr fünfzehn Süsses des kassierten
 und zum kassierten Vorkaufes, die Gleichung wird sich folgender,
 in der Form: $ba + ac - ca = d$

$$ba - ca = d - ac$$

$$a \cdot (b - c) = d - ac$$

$$a = \frac{d - ac}{b - c}$$

Geben wir diesen Ausdruck, mehr den Preis
 a bestimmungsgemässen Lieferung, so läßt sich diese Summe
 laßt in der Form ausrechnen

Sei nun die Differenz der Lieferungen Süsses = $134 = d$

Das Preis eines Süsses des kassierten Vorkaufes = $11\frac{1}{2}$

je eines Süsses der ganzen Lieferung des kassierten = $9\frac{1}{2}$ und

der Geldbetrag der ganzen Lieferung $d = 1320\frac{1}{2}$ somit

$$a = \frac{d - ac}{b - c} = \frac{1320 - 134 \cdot 9}{11 - 9} = \frac{114}{2} = 57 \text{ Süsses des kassierten Vorkaufes}$$

$$\begin{array}{r}
 134 \\
 57 \\
 \hline
 191 \text{ Süsses des kassierten Vorkaufes}
 \end{array}$$

Probe.

Wie viele Schickel sind durch den Verkauf, der in den ersten
 Geldbetrag und den Rest in Goldbarren und in den
 den ersten Geldbetrag gleich stellt. 57

69 3 Schickel aus
 62 7 1/2 Schickel aus
 1320 Schickel der ersten Geldbetrag

57
 62 7 1/2 Schickel der ersten Geldbetrag

II. Aufgabe. Ein Kaufmann hat ein Geschäft
 für ein Geschäft und hat 100 Lira. Man weiß
 um den ersten und den zweiten Tag von seinem
 so man das über den ersten und den zweiten Tag
 von 3 Tagen hat. Man weiß, dass er den ersten Tag
 nicht das erste Geschäft hat. Man weiß, dass er den ersten Tag
 nicht das erste Geschäft hat.

Lösung.

Man weiß, dass der Kaufmann sein Geschäft
 auf dem 1. Tag hat, so dass der erste Tag
 sein Geschäft hat 100 Lira. Man weiß, dass er den ersten Tag
 nicht das erste Geschäft hat. Man weiß, dass er den ersten Tag
 nicht das erste Geschäft hat.

$$\frac{100 + 100 + 100}{3} = \frac{300 + 100}{3} = \frac{400}{3}$$

4x - 100.

Da nun am Anfang des 2ten Jahres mindes 100 Lein von
denn magner. so bleib ich zur Handlung $\frac{4x - 100}{3} - 100 =$

4x - 700.

Da nun dieser Gewinn in Laufe des 2ten Jahres wieder
um ein Drittel vergrößert. so mach ich die Lein daffallen

$$= \frac{4x - 700}{3} + \frac{4x - 700}{9} = \frac{12x - 2100}{9} + \frac{4x - 700}{9} = \frac{16x - 2800}{9}$$

Da nun Anfang des 3ten Jahres die Lein halbiert
mindes 100 Le. in dem abgelaufenen 3ten Jahre Gewinn =

$$\frac{16x - 2800}{9} - 100 = \frac{16x - 2800 - 900}{9} = \frac{16x - 3700}{9}$$

Dieser Profit wird nun in Laufe des 3ten Jahres
abermal um ein Drittel vergrößert und beträgt nun

$$\text{finden daffallen} = \frac{16x - 3700}{9} + \frac{16x - 3700}{27} = \frac{48x - 11100}{27} +$$

$$\frac{16x - 3700}{27} = \frac{64x - 14800}{27}$$

Da nun dieser Profit allmählig anwachsen soll
Capital nach und nach anwachsen. so muß ich wissen

Polynomdivision:

$$64x - 14800 = 2x$$

$$64x - 14800 = 54x$$

$$64x - 54x = 14800$$

$$x(64 - 54) = 14800$$

$$x(10) = 14800$$

$$x = \frac{14800}{10} = 1480 \text{ Linieliter}$$

Probe:

$$1480 \text{ Linieliter} - 100 \text{ Linieliter} = 1380 \text{ Linieliter} + \frac{1}{3} \text{ Linieliter}$$

$$460$$

$$1840 \text{ Linieliter} \text{ bei } 1 \text{ Tag}$$

$$- 100 = 1740 \text{ Linieliter} + \frac{1}{3} \text{ Linieliter}$$

$$580$$

$$1480$$

$$1480$$

$$2960 \text{ Linieliter}$$

$$2320 \text{ Linieliter} \text{ bei } 2 \text{ Tagen}$$

$$- 100 = 2220 \text{ Linieliter} + \frac{1}{3} \text{ Linieliter}$$

$$740$$

$$2960 \text{ Linieliter} \text{ bei } 3 \text{ Tagen} =$$

$$2660 \text{ Linieliter} \text{ bei } 1 \text{ Tag}$$

III Aufgabe. Man muss zeigen, dass die Funktion $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ in der Umgebung von $x = 0$ die Eigenschaft hat, dass $f(x) > 0$ für $x > 0$ und $f(x) < 0$ für $x < 0$ gilt. Man soll dies mit Hilfe der ersten Ableitung zeigen.

1
 Seine Lamazung beginnt, so fallen von der Zeit hindan, wenn eine
 2^{te} von oben an anfangen wird?

Auflösung.

Es sey die Geschwindigkeit des ersten = a
 die Geschwindigkeit des zweiten = b , nach dem b geschwindigkeit
 als a ist, die Zeit immer mal so in Lamazung des letzten a als
 immer des ersten anfangt, sey = c und die Zeit mal so von Anfang
 der Lamazung des letzten bis dahin anfließt, wenn der erste
 anfließt, so an = x .

Das zurückgelegte Raum wird durch ein Produkt aus
 der Geschwindigkeit und der Zeit bestimmt = ac und jenes Raum
 mal so nach zurückgelegt, bis es in dem andern anfließt = ax .

Das ist der geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit von b in
 der Zeit a kommt, so ist der gewisse beschriebene Raum = bx .

Wenn im Augenblick der Zusammenkunft bey der
 Hängen denselben Raum zurückgelegt haben, so ist die
 Gleichung diese: $bx = ax + ac$

$$bx - ax = ac$$

$$x(b - a) = ac$$

$$x = \frac{ac}{b - a}$$

VIII Aufgabe. Allen sein ganzes Silber verkauft und 100
 Ellen Lins für 80 Ellen einmalt, so ist das Silber: 20 Pfund 5 Pfund
 zu wenig gewesen. 80 Ellen sein 3 Pfund zu viel. Man
 fragt, wie viele Pfund ganzes Silber für sich und wie viele
 Ellen Lins er pfund gab. 2

Auflösung.

Wie unbekanntes Maß der Pfunde = x . Dann zu 100 Ellen Lins
 5 Pfund zu wenig gewesen, so sollen die 100 Ellen 5 Pfund weniger
 sein 100 Ellen zu 80 Ellen einmalt, so soll das Silber für diese
 80 Ellen 3 Pfund zu wenig sein. Also $\frac{x+5}{100}$ gegeben haben. Vor dem
 Bekannten Maß zu 80 Ellen einmalt, so soll das Silber für diese
 80 Ellen 3 Pfund zu wenig sein. Also $\frac{x-3}{80}$ weniger Lins
 gegeben und Lins bedürft und Maß gefunden sind, so kann
 man beide dieser Gleichheiten nach einander
 Gleichung bringen, nach dem ersten Bekannten Lins abziehen
 laßt.

$$\text{Laßt. } \frac{x+5}{100} = \frac{x-3}{80}$$

$$80x + 400 = 100x - 300$$

$$400 + 300 = 100x - 80x$$

$$700 = 20x$$

$$700 = (20)x$$

$$x = \frac{700}{20} = 35 \text{ Pfund.}$$

Vorher 35 Pfund gekauft worden, so gab er 35 + 5 Pfund da-
mit für 100 Ellen, man hat zu zeigen, daß 1 Pfund Gerne
 $2\frac{1}{2}$ Ellen Lief gab.

IX. Aufgabe. folgt.

Auflösung

~~Vorher~~ Aufgaben mit zwei unbekannten Größen.

Die obige Aufgabe zeigt, wie das Manuskript
einmal in einem unbekannten Größte bestimmt werden
kann, wenn dieselbe in Verbindung mit bekannten
Größen in der Formel in das Gleichgewicht kommt; aber
so haben diese Auflösungen gezeigt, daß diese unbekannten
Größen nur in einem einzigen Manuskript sein können, wenn
sich auf diese Aufgaben bestimmt genommen werden.
Es zeigt sich nun, ob nicht auf ein & unbekanntes,
mehrere Aufgaben vorhanden sind, jede von ihnen
ebenfalls nur in einem einzigen bestimmten Manuskript
sein kann.

Man kann die Aufgaben & unbekannten
Größen ausfüllen in diesem Zusammenhang

2 Gleichförmigkeit so gebildet werden können, so z. B. so, daß
jeder von ihnen, derselben im bekannten Größem, nach
bekanntem Maßstab, so mindern für jeden derselben
einen bestimmten Maßstab finden können.

Wird man in jedem dieser beiden Gleichförmigkeiten nach den
beiden entwickelten Regeln, den Maßstab in einem
bekannten z. B. jenen so bestimmen, daß es in dem einen
Teil der Gleichförmigkeiten; jenen in der Verbindung mit
bekannten Größem in 2 Teil, so kann man
dieser beiden Gleichförmigkeiten jedesmal einen einzigen Teil,
welcher in jedem Größem, sondern in jedem nach dem bekannten
Größem ausfällt. In diesen beiden Gleichförmigkeiten wird man nun
den Maßstab in bekannten Größem bestimmen können.
Trägt man nun diesen Maßstab in die beiden gegebenen
Gleichförmigkeiten, welche sind zu erhalten, so wird es als bekannt
Größem in jedem Maßstab in jedem Maßstab
und wird leicht zu bestimmen sein.

Wenn man in der 2 Gleichförmigkeiten, welche als Grund gleichförmig
gegeben sind, jenen in Größem, d. h. in einem Teil
einer Linie kann, läßt sich dieser abwechselnd mit jedem

und auf diese Weise gegeben. Man ist überzeugt, dass:

Wenn man in die beiden Gleichungen $ax - y = b$ und $2y + a = 4x$ die beiden Gleichungen $ax - y = b$ und $2y + a = 4x$ in eine Gleichung setzt, so wird in dieser die bekannte Größe x erhalten sein. und diese leicht bestimmt werden können. Man muss die Gleichung $ax - y = b$ mit 2 multiplizieren, so dass die Gleichung $2ax - 2y = 2b$ entsteht, so kann man sie mit der Gleichung $2y + a = 4x$ addieren, so dass die Gleichung $2ax - 2y + 2y + a = 2b + 4x$ entsteht, d. h. $2ax + a = 2b + 4x$. Folglich: 1. $ax - y = b$

2. $2y + a = 4x$. Wenn man in der 1. die Gleichung $ax - y = b$ mit 2 multipliziert, so erhält man die Gleichung $2ax - 2y = 2b$. In der 2. Gleichung steht $2y + a = 4x$.

$$ax - b = y$$

$$4x = 2y + a$$

$$ax - b = y$$

$$x = \frac{2y + a}{4}$$

$$x(a - b) = y$$

$$x = \frac{y}{a - b}$$

Man ist in der Lage, die Gleichung $ax - y = b$ in die Gleichung $2y + a = 4x$ zu setzen, so dass man die Gleichung $2ax - 2y = 2b$ erhält. Wenn man diese Gleichung mit der Gleichung $2y + a = 4x$ addiert, so erhält man die Gleichung $2ax - 2y + 2y + a = 2b + 4x$, d. h. $2ax + a = 2b + 4x$. Folglich: 1. $ax - y = b$

Man ist in der Lage, die Gleichung $ax - y = b$ in die Gleichung $2y + a = 4x$ zu setzen, so dass man die Gleichung $2ax - 2y = 2b$ erhält. Wenn man diese Gleichung mit der Gleichung $2y + a = 4x$ addiert, so erhält man die Gleichung $2ax - 2y + 2y + a = 2b + 4x$, d. h. $2ax + a = 2b + 4x$. Folglich: 1. $ax - y = b$

$$\frac{y}{a - b} = \frac{2y + a}{4}$$

$$\frac{y}{a - b} = \frac{a^2 - ab}{(4 - 2a + 2b)} = \frac{(a - b) \cdot a}{2(2 - a + b)}$$

$$\frac{4y}{a - b} = 2y + a$$

$$4y = 2ay - 2by + a^2 - ab$$

$$4y - 2ay + 2by = a^2 - ab$$

$$y(4 - 2a + 2b) = a^2 - ab$$

bestimmung der Maßzahl y aberfalls in bekannten Größen
besteht. Wenn die Maßzahl zu finden trägt man
in oben gefundenen Maßzahl y in die obige Gleichung ein
Gleichung z. B. in $x = \frac{y}{a-b} \cdot \frac{a(a-b)}{2(a-ab)} \cdot a-b = \frac{a}{2(1-a+b)}$ modifiziert

Wenn die beiden Maßzahlen x und y bekannt sind. Setzt man
die Maßzahl y in die 2te Gleichung, nämlich $x = \frac{2y+a}{4} = \frac{2y}{4} + \frac{a}{4}$
so erhält man $x = \frac{a}{4} + \frac{y}{2}$

$$x = \frac{a}{4} + \frac{(a-b) \cdot a}{2(2-a+b) \cdot 2} = x = \frac{a}{4} + \frac{(a-b) \cdot a}{4(2-a+b)} = \frac{2a - a^2 + ab + a^2 - ab}{4(2-a+b)}$$

$$= \frac{2a}{4(2-a+b)} = \frac{a}{2(2-a+b)}$$

Wobei mit Hilfe des oben gefundenen
Grundgleichungen zuerst die Maßzahl x bestimmt soll
folgende Aufeinanderbeziehung, worin zuerst die Maßzahl
 y bestimmt werden soll. Aus der ersten Gleichung wird
 $y = ax - bx$ und mit der 2ten $y = \frac{4x-a}{2}$. Man nimmt
dies beiden Maßzahlen in die Gleichung ein, so gibt es

$$ax - bx = \frac{4x-a}{2}$$

$$2ax - 2bx = 4x - a$$

$$2ax - 2bx - 4x = -a$$

$$a - 2bx = 2ax + 4x$$

$$a = x(2b - 2a + 4)$$

$$x = \frac{a}{2b - 2a + 4} = \frac{a}{2(b-a+2)} \quad \text{wie oben.}$$

Um nun den Bruch zu vereinfachen in der obigen
Gleichung $y = \frac{4x - a}{2}$ nun substituieren wir in den
Bruch x . $y = \frac{4x - a}{2} = 2x - \frac{a}{2}$
 $y = \frac{2a}{2(b-a+1)} - \frac{a}{2} = \frac{a}{(b-a+1)}$

$$\frac{2a}{2(b-a+1)} - \frac{a}{2} = \frac{4a - 2ab + 2a^2 - 4a}{4(b-a+1)}$$

$$y = \frac{2a^2 - 2ab}{4(b-a+1)} = \frac{2a^2 - 2ab}{4b - 4a + 4} = \frac{a^2 - ab}{2b - 4a + 4}$$

$$y = \frac{a(a-b)}{2(b-a+1)}$$

II^{te} Aufgabe.

Die gegebenen Gleichungen lösen wir folgendermaßen:

$$1) \quad 3x - \frac{1}{2}y = 20 \Rightarrow x = \frac{20}{3} + \frac{y}{6}$$

$$2) \quad 5x + 3y = 36 \Rightarrow x = \frac{36 - 3y}{5}$$

$$\frac{20}{3} + \frac{y}{6} = \frac{36 - 3y}{5}$$

$$\frac{100}{3} + \frac{5y}{6} = 36 - 3y$$

$$100 + 15y = 108 - 9y$$

$$600 + 15y = 648 - 54y$$

$$15y = 648 - 54y - 600$$

$$15y + 54y = 648 - 600$$

$$y(69) = 648 - 600$$

$$y = \frac{48}{69} = \frac{16}{23}$$

$$\text{Supra } x = \frac{20}{3} + \frac{y}{6} = x = \frac{20}{3} + \frac{16}{23} = x = \frac{20}{3} + \frac{16}{138} = \frac{2760 + 16}{414} = \frac{2808}{414} =$$

$$= \frac{1404}{207} = 6\frac{162}{207}$$

III^{te} Aufgabe.

1^{te} Art.

$$1. 4x = 3y - 2x = 4x + 2x = 3y$$

$$x(4+2) = 3y$$

$$x = \frac{3y}{6}$$

$$2. 10x + 2y = 12$$

$$10x = 12 - 2y$$

$$x = \frac{12 - 2y}{10}$$

$$\frac{3y}{6} = \frac{12 - 2y}{10}$$

$$3y = \frac{72 - 12y}{10}$$

$$30y = 72 - 12y$$

$$30y + 12y = 72$$

$$y(30+12) = 72$$

$$y = \frac{72}{42} = \frac{36}{21} = \frac{12}{7} = 1\frac{5}{7}$$

substituieren in d. G. u. d.

$$x = \frac{3y}{6} = \frac{12}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{36}{7 \times 6} =$$

$$\frac{36}{42} = \frac{6}{7}$$

2^{te} Art.

$$1. y = -\frac{2x}{3}$$

$$- \frac{2x}{3} = \frac{12 - 10x}{3}$$

$$2. y = \frac{12 - 10x}{2}$$

$$- \frac{2x}{3} = \frac{36 - 30x}{3}$$

$$- 6x = 36 - 30x$$

$$30x - 6x = 36$$

$$x(24) = 36$$

$$x = \frac{36}{24} = \frac{6}{4}$$

substituieren

$$y = \frac{12 - 10x}{2} = \frac{12 - 60}{2} = \frac{-48}{2} = -24$$

$$- \frac{84}{4} = \frac{24}{4} \times 2 = \frac{24}{4} \times \frac{1}{2} =$$

$$\frac{24}{14} = 1\frac{10}{14} = 1\frac{5}{7}$$

W

IV Aufgabe.

$$1) 2ax - 3by = c = 2ax - 3by = c$$

$$2) 4ay + 6x = d \quad \begin{aligned} 2ax &= c + 3by \\ x &= \frac{c + 3by}{2a} \end{aligned}$$

$$6x = d - 4ay$$

$$x = \frac{d - 4ay}{6}$$

$$\frac{d - 4ay}{6} = \frac{c + 3by}{2a}$$

$$d - 4ay = \frac{6c + 3by}{2a}$$

$$2ad - 8a^2y = 6c + 3b^2y$$

$$-8a^2y - 3b^2y = 6c - 2ad \text{ gesamt!}$$

$$2ad - 6c = 8a^2y + 3b^2y$$

$$y(8a^2 + 3b^2) = 2ad - 6c$$

$$y = \frac{2ad - 6c}{(8a^2 + 3b^2)}$$

$$x = \frac{c + 3by}{2a} = x = \frac{c}{2a} + \frac{3b}{2a} \times \frac{2ad - 6c}{8a^2 + 3b^2}$$

V Aufgabe.

$$1) \frac{a}{c-x} = \frac{b}{2a+y} = a = \frac{cb - ba}{2a+y}$$

$$2) ba - y = c$$

$$-y = c - ba$$

$$y = ba - c$$

$$2a^2 + ay = cb - ba$$

$$ay = cb - ba - 2a^2$$

$$y = \frac{cb - ba - 2a^2}{a}$$

$$\frac{cb - bx - 2a^2}{a} = bx - c$$

$$cb - bx - 2a^2 = abx - ac$$

$$cb - bx - 2a^2 - abx = -ac$$

$$-bx - 2a^2 - abx = -ac - cb$$

$$-bx - abx = -ac - cb + 2a^2$$

$$ac + cb - 2a^2 = bx + abx$$

$$ac + cb - 2a^2 = x \cdot (b + ab)$$

$$x = \frac{ac + cb - 2a^2}{b + ab}$$

$$- \frac{c - ac}{1+a} = \frac{ac + cb - 2a^2 - ac - c}{1+a} = \frac{bc - 2a^2 - c}{1}$$

Substituierung

$$\tilde{y} = bx - c$$

$$\tilde{y} = \frac{ac + cb - 2a^2}{b + ab} \times b - c$$

$$\tilde{y} = \frac{ac + cb - 2a^2}{b + ab} \times b - c =$$

$$= \frac{abc + b^2c - 2a^2b}{b + ab} =$$

$$= \frac{ac + bc - 2a^2}{1+a} - \frac{c}{1+a} = \frac{ac + bc - 2a^2 - c}{1+a}$$

II. Aufgabe.

Substituierung

$$1) \frac{b+a}{2} = 3\tilde{y} = b+a - b\tilde{y}$$

$$2) \frac{b-y}{3} = 5x, \quad a = \frac{by}{3} - b =$$

$$b-y = 15x$$

$$x = \frac{b-y}{15}$$

$$by - b = \frac{b-y}{15}$$

$$90y - 15b = b - y$$

$$90y + y = b + 15b$$

$$91y = 16b$$

$$y = \frac{16b}{91}$$

III. Aufgabe

Ein Mischfah zimmert in einer Stadt die Mauer der
grünigen Lust der in Mauer der Luffen der Stadt. R.

...sonjender Göttinger Zeitung.

$$x + y = 80 \quad \cdot \quad \underline{x = 80 - y}$$

$$2h\alpha + h\beta\gamma = 25603$$

242-2560-488

$$24x - 2560 - 48y$$

$$x - \frac{2560 - 48y}{24} =$$

$$80 - y = \frac{2560 - 48y}{24}$$

1920-247 = 2560-484

$$1920-24y+48y = 2560$$

$$184 - 249 = 2560 - 1920$$

$$y(48-24) = 2560 - 1920$$

$$g = \frac{640 \cdot 2320}{12} = 26\frac{2}{3}$$

$$= \frac{1920 - 640}{2h} = \frac{1280}{2h} = 53\frac{1}{3}$$

als Desfinsaw's urf. 263
VIII. Ausgabe.

VIII. Aufgabe.

[illegible]

Auflösung

$$1. x + y = 6. = \underline{\underline{x = 6 - y}}$$

$$2) \frac{x}{5} = \frac{y}{4} = x = \frac{5y}{4}$$

$$4x = 5y$$

$$x = \frac{5y}{4}$$

Substitution in

$$x = 6 - y = 6 - \frac{8}{3} = \frac{18 - 8}{3} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$$

$$6 - y = \frac{5y}{4}$$

$$24 - 4y = 5y$$

$$-4y = 5y - 24$$

$$-4y - 5y = -24$$

$$24 = 5y + 4y$$

$$24 = 9y$$


$$y = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

also $3\frac{1}{3}$ Jafar sollte es sein und $2\frac{2}{3}$ Jafar müsste sein
auf Summe.

Aufgabe.

$$1. x + y = 50$$

$$2) \frac{3}{4}x + \frac{5}{6}y = 40$$





Lehre von der Algebra

[Regensburg] [ca.1849]

Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/Philos.3469a

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11302065-6